




## Degré de danger 3 - Marqué



**Tendance: danger d'avalanche constant** →  
 le jeudi 17 12 2020



Neige  
 ancienne  
 (Sous-couche  
 fragile  
 persistante)



Neige  
 soufflée  
 (Neige  
 ventée)



Des couches fragiles en partie inférieure du manteau neigeux demandent prudence et retenue.

Des couches fragiles marquées en partie inférieure du manteau neigeux peuvent être déclenchées par des amateurs de sports d'hiver isolés. Prudence surtout sur les pentes raides à l'ombre au-dessus d'environ 2200 m comme sur les pentes raides ensoleillées au-dessus d'environ 2600 m, aussi dans les endroits plutôt faiblement enneigés comme aux transitions entre les endroits peu enneigés et les endroits très enneigés, notamment à l'entrée des combes et des couloirs. Des avalanches sont de manière très isolée de grande taille.

Les accumulations de neige soufflée fraîches et relativement anciennes devraient être évaluées avec prudence, surtout à proximité des crêtes, dans les combes et couloirs au-dessus d'environ 2200 m. Celles-ci peuvent être parfois déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver. Les accumulations de neige soufflée se sont encore davantage développées surtout dans les régions concernées par le foehn. Les accumulations récentes et déjà plus anciennes de neige soufflée sont partiellement recouvertes de neige fraîche et donc difficilement identifiables. Prudence dans la zone de la limite de la forêt. Les accumulations de neige soufflée nouvelles reposent en partie sur du givre de surface.

Sur les pentes raides herbeuses des avalanches de glissement sont possibles, surtout de taille moyenne, notamment sur les pentes très raides ensoleillées en dessous d'environ 2600 m.

La situation avalancheuse actuelle demande de l'expérience dans l'évaluation du danger d'avalanche et un choix prudent des itinéraires.

## Manteau neigeux

### Modèles de danger

md.1: sous-couche fragile persistante

md.8: givre de surface enneigé

La partie supérieure du manteau neigeux est assez homogène, avec une surface meuble. Des accumulations de neige soufflée en partie fragiles se sont formées dans les derniers jours à toutes les expositions, surtout sur les pentes proches des crêtes à l'ombre. Les accumulations de neige soufflée reposent en partie sur du givre de surface dans la zone de la limite de la forêt.

Par endroits le manteau neigeux ancien est fragile, surtout sur les pentes raides à l'ombre. La partie inférieure du manteau neigeux a subi une métamorphose constructive à grains anguleux et est fragile. Les




départs d'avalanches et les tests de stabilité confirment la structure défavorable du manteau neigeux. Des bruits sourds et des fissures lors du passage sur le manteau neigeux sont des signes nets d'une structure fragile du manteau neigeux. La partie supérieure du manteau neigeux est humide, surtout sur les pentes très raides ensoleillées comme à basse et moyenne altitude.

## Tendance

Diminution à peine marquée du danger.



## Degré de danger 3 - Marqué



**Tendance: danger d'avalanche constant** →  
le jeudi 17 12 2020



Avalanches de glissement  
(Avalanches de fond)



Neige soufflée  
(Neige ventée)



Limite de la forêt

### Prudence en présence de fissures de glissement. Neige soufflée à surveiller.

Le danger d'avalanches de glissement subsiste. Sur les pentes très raides herbeuses et sur les pentes ensoleillées des avalanches de glissement sont toujours possibles, éventuellement d'assez grande taille. Les tronçons exposés des voies de communication peuvent être menacés de manière isolée spécialement dans les régions bien enneigées. Les zones présentant des fissures de glissement doivent être évitées. Les accumulations de neige soufflée de la semaine écoulée doivent être évaluées avec précaution surtout sur les pentes exposées à l'ouest à est en passant par le nord. Celles-ci reposent sur une surface de neige ancienne défavorable surtout sur les pentes à proximité des crêtes à l'ombre, prudence aussi dans la zone de la limite de la forêt. Les accumulations de neige soufflée nouvelles reposent en partie sur du givre de surface.

## Manteau neigeux

### Modèles de danger

md.2: neige glissante

md.6: froid, neige légère et vent

La partie supérieure du manteau neigeux est assez homogène, avec une surface meuble. Des accumulations de neige soufflée en partie fragiles se sont formées dans les derniers jours à toutes les expositions, surtout sur les pentes proches des crêtes à l'ombre. Les accumulations de neige soufflée reposent en partie sur du givre de surface dans la zone de la limite de la forêt.

Par endroits le manteau neigeux ancien est défavorable. La partie inférieure du manteau neigeux a subi une métamorphose constructive à grains anguleux et est fragile. Les couches fragiles proches du sol peuvent encore être déclenchées de manière très isolée.

## Tendance

Diminution à peine marquée du danger.

## Degré de danger 2 - Limité



**Tendance: danger d'avalanche constant** →


le jeudi 17 12 2020



Neige soufflée  
(Neige ventée)



Limite de la  
**forêt**



Avalanches de  
glissement  
(Avalanches  
de fond)



**2600m**

Neige soufflée constituant le danger principal. En outre, des avalanches de glissement isolées sont possibles.

Les accumulations de neige soufflée en partie grosses de la semaine écoulée doivent être évaluées avec précaution surtout sur les pentes exposées à l'ouest à est en passant par le nord au-dessus de la limite de la forêt. Elles sont en partie épaisses et surtout déclenchables avec une surcharge importante.

Sur les pentes très raides herbeuses et sur les pentes ensoleillées des avalanches de glissement sont possibles, éventuellement d'assez grande taille. Les tronçons exposés des voies de communication peuvent être menacés de manière isolée spécialement dans les régions bien enneigées. Les zones présentant des fissures de glissement doivent être évitées.

Des avalanches peuvent être déclenchées dans les couches profondes de manière isolée et atteindre une grande taille de manière isolée. Ceci à partir des zones de départ très raides pas encore déchargées à haute altitude et en haute montagne. Prudence surtout aux transitions entre les endroits peu enneigés et les endroits très enneigés.

## Manteau neigeux

**Modèles de danger**

md.2: neige glissante

md.6: froid, neige légère et vent

Le manteau neigeux est assez bien consolidé. Des accumulations plus récentes de neige soufflée se situent surtout dans les combes, couloirs et derrière les ruptures de terrain. Les différentes accumulations de neige soufflée sont parfois mal liées entre elles. Ceci à haute altitude et en haute montagne. La partie supérieure du manteau neigeux est meuble, avec du givre de surface non enfoui. Profondément dans le manteau neigeux ancien des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sont présentes, spécialement à haute altitude et en haute montagne. La partie inférieure du manteau neigeux est humide. Ceci particulièrement à basse et moyenne altitude.

## Tendance

Le danger d'avalanches subsiste. Des avalanches de glissement isolées peuvent également se déclencher pendant la nuit.

## Degré de danger 1 - Faible



**Tendance: danger d'avalanche constant** →

le jeudi 17 12 2020



Neige soufflée  
(Neige ventée)



2000m

### Attention à la neige soufflée.

Les accumulations de neige soufflée déjà relativement anciennes constituent le danger principal. Elles peuvent être déclenchées surtout avec une surcharge importante surtout sur les pentes exposées au nord-ouest à nord-est en passant par le nord à haute altitude. Elles sont généralement petites.

### Manteau neigeux

#### Modèles de danger

md.6: froid, neige légère et vent

md.8: givre de surface enneigé

Des accumulations de neige soufflée en partie fragiles se sont formées dans les derniers jours à haute altitude. Le manteau neigeux ancien est partiellement stable, notamment sur les pentes raides à l'ombre à haute altitude. À basse et moyenne altitude il y a peu de neige. Le manteau neigeux est meuble, avec du givre de surface non enfoui, surtout dans la zone de la limite de la forêt. Les accumulations récentes de neige soufflée reposent en partie sur du givre de surface.

### Tendance

Le danger d'avalanches subsiste.