




Grad de perillh 3 - Mercat



Tendència: perillh de lauegi constant
enDissabte 09 01 2021 →



Era situacion de lauegi qu'ei en quauqui casi precària. Es coches febles presentes ena part superficial deth mantèth de nhèu requerissen precaucion

Es coches de nhèu apròp dera superfícia requerissen precaucion Es lauegi sequi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vieja feble e arténher dimensions fòrça granes. Açò s'aplique eseciaument enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst entre es 2300 e es 2600 m aproximativament. Son possibles desencadenaments a distància. Endrets perilhosi per lauegi sequi se tròben tanben enes pales ombrères fòrça arribentes. Tanben per dejós deth limit deth bòsc. Delicadi son es endrets a on era gibra de superfícia a demorat caperada de nhèu. Es endrets perilhosi son cubèrti damb nhèu recenta e de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son possibles senhaus de perillh

Naues acumulacions de nhèu ventada son petites. Aguesti endrets perilhosi se tròben sustot apròp des crestes.

Ath delà i a un perillh latent de lauegi d'esguitliment basau.

Ei importanta ua eleccion meticulosa der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Açò s'aplique eseciaument enes pales soleienques entre es 2300 e es 2600 m aproximativament. Es plaques de vent caperades de nhèu recenta repòsen locaument ath dessus de gibra de superfícia. Damb es baishes temperatures, eth mantèth de nhèu tot just s'arribarà a fixar.



Era part centrau deth mantèth ei ben consolidada. Era part basau deth mantèth ei ben consolidada.

Tendència

Era situacion de lauegi qu'ei en quauqui casi precària.



Grad de perillh 3 - Mercat



Tendència: perillh de lauegi constant

enDissabte 09 01 2021 →



Coches fèbles persistentes



Limit deth bòsc



Coches fèbles persistentes



Limit deth bòsc

Era situacion de lauegi qu'ei precària. Es coches febles presentes ena part superficial deth mantèth de nhèu requerissen precaucion

Es lauegi sequi pòden desencadenar-se pes diuèrses coches de nhèu recenta e ventada e arténher dimensions fòrça granes. Son possibles desencadenaments a distància. Endrets perilhosi per lauegi sequi se tròben enes pales ombrères arribentes. Tanben per dejós deth limit deth bòsc. Es endrets perilhosi son cubèrti damb nhèu recenta e de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma

Nauas acumulacions de nhèu ventada son petites. Aguesti endrets perilhosi se tròben sustot apròp des crestes.

A conseqüència dera radiacion solara, ath long dera jornada non son possibles nau purgues e lauegi de nhèu seca, tanben fòrça grani.

Ath delà i a un perill latent de lauegi d'esguitlament basau. S'arrecomane ua eleccion meticulosa der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu



Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Es plaques de vent mès recentes repòsen locaument ath dessus de gibra de superfícia. Damb es baishes temperatures, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas.

Era part basau deth mantèth ei ben consolidada.

Tendència

Era situacion de lauegi qu'ei encara delicada.

Grad de perihl 3 - Mercat




Tendència: perihl de lauegi constant
enDissabte 09 01 2021 →



Coches fèbles
persistentes



Coches
fèbles
persistentes



Es coches febles presentes ena basa deth mantèth de nhèu requerissen precaucion Entà es excursions damb esquís e raquetes de nhèu en terren inclinat, es condicions son en quauqui casi desfavorables.

Era nhèu recenta e es plaques de vent dera darrèra setmana an d'èster avalorades damb prudència per dessus deth limit deth bòsc. Ja un solet excursionista pòt en fòrça endrets desencadenar lauegi, tanben de mida grana. Encara son possibles de manèra isolada lauegi naturaus de mida mejana e, locaument, grana. Precaucion enes pales arribentes encara per dejós deth limit deth bòsc, e tanben ath pè de parets rocassoses e ath darrèr de cambis abruptes de pendent.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua estructura febla deth mantèth de nhèu Son possibles desencadenaments a distància. Ath delà i a un perihl latent de lauegi d'esguitliment basau. Açò s'aplique especiaument enes pales erbooses arribentes en cas de radiacion solara.

Era actuau situacion de lauegi requerís fòrça experiència ena avaloracion deth perihl de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu


De cap ara superfícia, era nhèu ei fòrça omogenèa, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion. En quauqui endrets era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessus de gibra de superfícia. Era nhèu recenta e es plaques de vent dera darrèra setmana s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha en totes es orientacions. Especiaument enes pales ombrères, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Era part basau deth mantèth ei ben consolidada. Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes an demorat caperadi de nhèu e per aquerò practicamente non se pòden detectar.

Tendència

En nautada era situacion de lauegi qu'ei encara delicada. Damb es baishes temperatures, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDissabte 09 01 2021



Nhèu ventada



Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi sequi se tròben especiaument apròp des crestes de totes es orientacions.

Es acumulacions de nhèu ventada mès vielhes son principaument primes e se pòden desencadenar de manèra isolada. Açò s'aplique especiaument apròp des crestes per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques. Açò s'aplique de manèra isolada pera subrecarga d'un unic montanhaire. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda



En aguesti non i a qu'un shinhau de nhèu. Eth mantèth de nhèu vielh ei feble de manèra generalizada. Acumulacions de nhèu ventada mès vielhes se tròben ath dessús d'un mantèth de nhèu vielha feblament estacat. Ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.




Grad de perill 2 - Moderat



Tendència: perill de lauegi constant →
enDissabte 09 01 2021



Coches fèbles
persistentes



Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi sequi se tròben enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2200 m aproximativament.

Es coches febles presentes ena basa deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se damb subrecargues fòrtes. Açò s'aplique especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques. Es lauegi son en part de mida mejana.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda


Enes pales arribentes ombrères per dessús des 2200 m aproximativament: Eth mantèth de nhèu vielh ei procliu ath desencadenament en quauqui endrets. Ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Acumulacions de nhèu ventada mès vielhes se depositaràn locaument ath dessús de gibra de superfícia. Especiaument als sectors deth nòrd non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendència

Eth perill de lauegi demorarà invariable.



Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDissabte 09 01 2021



Coches fèbles
persistentes



Era actua situacion de lauegi requerís experiéncia ena avaloracion deth perih de lauegi.

Era situacion de lauegi qu'ei en quauqui casi precària. Açò s'aplique eseciaument enes sectors deth sud. Sustot enes pales soleienques arribentes, es coches febles presentes ena part superficial deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un montanhaire. Açò s'aplique eseciaument entre es 2300 e es 2600 m aproximativament. Es lauegi son aumens de mida mejana. Desfavorables son tanben es endrets a on era gibra de superfícia a demorat caperada de nhèu. Precaucion sustot enes pales ombrères fòrça arribentes enes zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques. Tanben en còtes mejanes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Açò s'aplique eseciaument enes pales soleienques entre es 2300 e es 2600 m aproximativament. Es plaques de vent mès antigues repòsen locaument ath dessús de gibra de superfícia. Era part basau deth mantèth ei ben consolidada.

Tendència

Es coches febles presentes ena part superficial deth mantèth de nhèu requerissen precaucion



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →
enDissabte 09 01 2021

Feble, grad 1.

Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi sequi se tròben enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2000 m aproximativament. Sustot apròp des crestes. Es endrets perilhosi son rari e de bon reconéisher.

Celh de nhèu

En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn. Ath laguens deth mantèth de nhèu non se tròben practicament coches febles.

Tendència

Feble, grad 1.