



Grado de Peligro 3 - Notable




Tendencia: peligro de aludes en aumento ↗
 en Domingo 07 02 2021



Nieve húmeda



2400m



Capas débiles persistentes



1900m



Nieve venteada



2400m

Incluso durante la noche son posibles avalanchas de fusión y de deslizamiento basal. El problema de capas débiles persistentes debe ser evaluado de manera crítica.

A consecuencia del aumento de la temperatura diurna y la radiación solar, son probables avalanchas de nieve húmeda o muy húmeda. Los aludes pueden, aún, implicar capas más profundas y alcanzar tamaños peligrosamente grandes. Además hay peligro de aludes de deslizamiento basal. También en las laderas umbrías inclinadas.

Las capas débiles presentes en la nieve antigua pueden ser desencadenadas ya en algunos lugares al paso de un solo montañero. Precaución en todas las orientaciones por encima de los 1900 m aproximadamente. Sobre todo en las laderas muy inclinadas, y en las zonas de transición de manto delgado a grueso.

Además en cotas altas y zonas de alta montaña las placas de viento, a veces de tamaño grande, son localmente proclives al desencadenamiento.

Manto nivoso

Patrones de peligro

pp.7: zonas de poca nieve en entornos con mucha nieve

pp.10: escenario de primavera

Las condiciones meteorológicas primaverales han causado por debajo de los 2400 m aproximadamente una progresiva humidificación del manto de nieve. En las laderas inclinadas solanas y en cotas bajas y medias: El manto de nieve es húmedo, con una costra de rehielo no portante en superficie.

En todas las orientaciones, en la parte central del manto de nieve se encuentran capas débiles inestables. Principalmente por encima de los 1900 m aproximadamente.

Tendencia

En cotas bajas y medias: A consecuencia de la lluvia, aumento del peligro de aludes. En cotas altas y en zonas de alta montaña: A consecuencia de la nieve reciente y el viento, aumento del peligro de aludes.