




Grad de perill 3 - Mercat




Tendència: perill de lauegi constant →

enDiumenge 07 02 2021



Nhèu umida



Esguitlament de nhèu



2400m



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Damb era pujada de temperatures e era radiacion solara perill mercat (3) de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

A conseqüència der aument dera temperatura, en tot moment son possibles cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu umida e fòrça umida, tanben fòrça grani. Tanben enes pales ombrères apròp des crestes, en canaus e conques.

Damb eth vent fòrt deth quadrant sud-oèst, en fòrça endrets s'an format plaques de vent a viatges inestables. Sustot enes pales orientades a èst, nòrd e sud-èst per dessus des 2000 m aproximativament. Precaucion sustot enes pales fòrça arribentes, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.10: scenari de primavera

Es condicions de temps primauerau an causat ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu. Sustot enes pales fòrça arribentes soleienques e en còtes baixes e mejanes: Agustes condicions meteorologiques facilitaràn a compdar deth maitin un afebliment deth mantèth de nhèu sustot enes pales soleienques.

Damb eth vent fòrt deth sud-oèst, s'an format plaques de vent addicionaus. Açò s'aplique apròp des crestes sustot per dessus deth limit deth bòsc.

Tendència

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, aument deth perill de lauegi.

Grad de perillh 3 - Mercat



Tendència: perillh de lauegi constant →
enDiumenge 07 02 2021



Nhèu umida



2400m




Nhèu ventada



Limit deth bòsc



Coches fèbles persistentes



2200m

Damb era pujada de temperatures e era radiacion solara perillh mercat (3) de lauegi umits e fòrça umits. Damb eth vent fòrt, en còtes nautes s'an format plaques de vent a viatges inestables.

A conseqüència der aument dera temperatura, son probables lauegi de nhèu umida e fòrça umida. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes. Ath delà i a un perillh de lauegi d'esguitlament basau. Tanben enes pales ombrères arribentes.

Es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. Precaucion en totes es orientacions per dessus des 1900 m aproximativament.

Sustot enes pales fòrça arribentes, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut.

Ath delà en còtes nautes e zònes de nauta montanha es plaques de vent a viatges de mida grana son locaument favorables ath desencadenament.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.10: scenari de primavera

Era part basau deth mantèth ei majoritàriament establa. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Sustot per dessus des 1900 m aproximativament.

Damb eth vent fòrt deth sud-oèst, s'an format plaques de vent addicionaus. Especiaument en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Es condicions de temps primaverau causaràn ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu. Enes pales fòrça arribentes soleienques e en còtes baixes e mejanes: Eth mantèth de nhèu ei umit, damb ua crosta de regèu tot just portanta en superfícia.

Tendència

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, aument deth perillh de lauegi.