




Grad de perill 3 - Mercat



Damb era pujada de temperatures e era radiacion solara perill mercat (3) de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

A conseqüéncia der augment dera temperatura, en tot moment son possibles cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu umida e fòrça umida, tanben fòrça grani. Tanben enes pales ombrères apròp des crestes, en canaus e conques.

Damb eth vent fòrt deth quadrant sud-oèst , en fòrça endrets s'an format plaques de vent a viatges inestables. Sustot enes pales orientades a èst, nòrd e sud-èst per dessús des 2000 m aproximativament. Precaucion sustot enes pales fòrça arribentes, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.10: scenari de primauera

Es condicions de temps primauerau an causat ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu. Sustot enes pales fòrça arribentes soleienques e en còtes baishes e mejanes: Aguestes condicions meteorologiques facilitaràn a compdar deth maitin un afebliment deth mantèth de nhèu sustot enes pales soleienques.

Damb eth vent fòrt deth sud-oèst , s'an format plaques de vent addicionaus. Açò s'aplique apròp des crestes sustot per dessús deth limit deth bòsc.

Tendència

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, augment deth perill de lauegi.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDiumenge 07 02 2021



Nhèu umida




2400m
↓




Nhèu ventada



Limit deth bòsc



Coches fèbles persistentes



2200m
↑

Damb era pujada de temperatures e era radiacion solara perilh mercat (3) de lauegi umits e fòrça umits. Damb eth vent fòrt , en còtes nautes s'an format plaques de vent a viatges inestables.

A conseqüéncia der augment dera temperatura, son probables lauegi de nhèu umida e fòrça umida. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes. Ath delà i a un perilh de lauegi d'esquitlament basau. Tanben enes pales ombrères arribentes.

Es coches febles presents ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. Precaucion en totes es orientacions per dessús des 1900 m aproximativament. Sustot enes pales fòrça arribentes, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut.

Ath delà en còtes nautes e zònes de nauta montanha es plaques de vent a viatges de mida grana son locaument favorables ath desencadenament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.7: zònes prauves de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.10: scenari de primauera

Era part basau deth mantèth ei majoritàriament establa. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Sustot per dessús des 1900 m aproximativament.

Damb eth vent fòrt deth sud-oèst , s'an format plaques de vent addicionaus. Especiaument en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Es condicions de temps primauerau causaràn ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu. Enes pales fòrça arribentes soleienques e en còtes baishes e mejanes: Eth mantèth de nhèu ei umit, damb ua crosta de regèu tot just portanta en superfícia.

Tendéncia

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, augment deth perilh de lauegi.