





AM





PM





Grad de perilh 3 - Mercat

AM:



Tendència: perilh de lauegi constant
en Dijaus 01 04 2021



Nhèu umida




Coches fèbles persistentes



Limit deth bòsc

PM:



Tendència: perilh de lauegi constant
en Dijaus 01 04 2021



Nhèu umida



Coches fèbles persistentes



Limit deth bòsc

Pendent eth maitin era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorable. A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, clar augment deth perilh de lauegi.

Prumèra ora deth maitin: Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh. Quauqu'uns endrets perilhos per lauegi sequi se tròben sustot enes pales orientades a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst. Precaucion sustot enes pales extrèmament dretes, e tanben enes pales pòc freqüentades e damb pòc celh de nhèu. Tanben apròp des crestes. Aguesti endrets perilhos son fòrça rari. Es lauegi son de manera isolada en generau de mida grana.

A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, a compdar dera maitiada eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau aumentarà clarament. Enes pales soleienques, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi naturaus de nhèu fòrça umida de mida mejana e, locaument, grana en totes es côtes. Tanben, es lauegi umidi e fòrça umidi pòden desencadenar-se enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu ath pas d'un solet montanhaire.

Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau. Es excursions de montanya e es baishades dehòra de pista an de finalizar ara ora.

Celh de nhèu

**Patrons de perillh**

pp.10: scenari de primauera

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Eth heiredament nocturn serà fòrça bon. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perillhosa per esguitlades enes pales arribentes. Enes pales soleienques eth mantèth de nhèu s'estovarà ja de maitiada. Acumulacions de nhèu ventada mès vielhes repòsen ath dessús de coches trendes. Sustot enes pales pòc freqüentades per dessús deth limit deth bòsc, e tanben apròp des crestes en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Tendéncia



Dempús d'ua net serena, i aurà en altitud condicions de lauegi favorables. Eth perillh de lauegi augmentarà clarament ath long deth dia.



Grad de perilh 2 - Moderat

AM:

Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDijaus 01 04 2021 →

**PM:**

Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDijaus 01 04 2021 →



Era situacion de lauegi qu'ei generaument favorable. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, progressiu aument deth perilh de lauegi.

Es lauegi son aumens de mida petita. Es endrets perilhosí son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt. Aguesti endrets perilhosí augmentaràn damb era altitud.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi umits aumentarà progressivament. Aço s'aplique especiaument enes pales erbosees fòrça arribentes en còtes mejanas.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

Eth heiredament nocturn serà fòrça bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta enes còtes nautes e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.


Enes pales soleienques non i a nhèu.

Tendéncia

Dempús d'ua net serena, i aurà condicions de lauegi favorables, a compdar d'alavetz aumentarà eth perill de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.




Grad de perilh 3 - Mercat

AM:

Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Dijaus 01 04 2021



Nhèu umida

**Limit deth bòsc****PM:****Limit deth bòsc**

Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Dijaus 01 04 2021



Nhèu umida

**Limit deth bòsc**

Enes pales ombrères era situacion de lauegi qu'ei favorabla ath maitin encara en quauqui endrets. Enquia que non baishen es temperatures, posterior aument deth perilh de lauegi d'esguitlament basau e purgues.

Sustot en canaus e conques e ath darrèr de cambis abruptes de pendent s'an format plaques de vent ben visibles. Es acumulacions de nhèu ventada mès vielhes se pòden desencadenar damb facilitat de manera accidentau o, isoladament, de manera naturau especiaument en pales soleienques arribentes. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perilhosí son nombrosi mès de bon reconéisher entath montanhaire expèrt. Aguesti endrets perilhosí aumentaràn damb era altitud.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perilh de lauegi d'esguitlament basau e purgues aumentarà progressivament. Aço s'aplique especiaument enes pales erbosees en côtes mejanes en totes es orientacions.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors redusit. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets. Enes pales orientades a sud-èst peth sud enquiat sud non i a nhèu.

Tendéncia

Dempús d'ua net serena, eth maitin anarà seguit per provisionaument condicions de lauegi favorables en fòrça sectors, a compdar d'alavetz aumentarà eth perill de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.