


Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant
enDimèrcles 21 04 2021



Coches fèbles
persistentes



Nhèu
ventada



Es coches febles presentes ena part superficial deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se encara en quauqui endrets.

En totes es orientacions, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Especiaument per dessus des 2200 m aproximativament. Es lauegi pòden de manèra isolada desencadenar-se damb ua subrecarga febla e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. Es endrets perilhosi se tròben enes pales arribentes de totes es orientacions. Possibles de manèra isolada lauegi naturaus. Principaument enes pales ombrères fòrça arribentes entre es 2200 e es 2600 m aproximativament. Es sons isoladi de "whumpf" son possibles senhaus de perilh

Naues e vielhes acumulacions de nhèu ventada se pòden desencadenar sonque de manèra isolada. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes orientacions nòrd-oèst a nòrd-èst peth nòrd per dessus des 2200 m aproximativament. Tanben apròp des crestes de totes es orientacions en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Ar oèst der Öztaler Ache era situacion de lauegi ei mès favorabla.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Especiaument enes pales arribentes soleienques per dessus des 2200 m aproximativament: De cap ara superfícia, era nhèu presente ua estratificacion desfavorabla, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion qu'arrepòse sus ua crosta. Eth mantèth de nhèu ei procliu ath desencadenament en quauqui endrets. Especiaument enes pales damb acumulacions de nhèu ventada.


Era nhèu recenta dera darrèra setmana e tanben es plaques de vent plaques de vent se tròben ath dessus d'un mantèth feble de nhèu vieilha sustot en pales ombrères.

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors lèu absent. Locaument queirà un shinhau de nhèu. Sustot enes Aups dera Zillertal septentrionaus, enes Aups deth Chiemgau e en Grop deth Venediger queirà de 10 a 15 cm de nhèu per dessus des 1300 m aproximativament.

Tendència

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perilh de lauegi umits e fòrça umits. Açò s'aplique tanben en còtes nautes.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant
 enDimèrcles 21 04 2021 →



Coches fèbles
 persistentes



Nhèu
 ventada



Es coches febles presentes ena part superficial deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se encara en quauqui endrets.

En totes es orientacions, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Especiaument per dessus des 2200 m aproximativament. Es lauegi pòden de manera isolada desencadenar-se damb ua subrecarga febla e arténher mida mejana. Es endrets perihosi se tròben sustot enes pales arribentes èst a oèst peth sud. De manera isolada tanben enes pales ombrères arribentes e damb pòc celh de nhèu. Es sons isoladi de "whumpf" son possibles senhaus de perih

Naues e vielhes acumulacions de nhèu ventada se pòden desencadenar sonque de manera isolada. Es endrets perihosi se tròben sustot enes orientacions nòrd-oèst a nòrd-èst peth nòrd per dessus des 2200 m aproximativament. Tanben apròp des crestes de totes es orientacions en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Especiaument enes pales arribentes soleienques per dessus des 2200 m aproximativament: De cap ara superfícia, era nhèu presente ua estratificacion desfavorable, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion qu'arrepòse sus ua crosta. Eth mantèth de nhèu ei procliu ath desencadenament en quauqui endrets. Especiaument enes pales damb acumulacions de nhèu ventada.


Era nhèu recenta dera darrèra setmana e tanben es plaques de vent se tròben ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères.

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors lèu absent. Locaument queirà un shinhau de nhèu. Sustot enes Aups dera Zillertal septentrional, enes Aups deth Chiemgau e en Grop deth Venediger queirà de 10 a 15 cm de nhèu per dessus des 1300 m aproximativament.

Tendència

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perih de lauegi umits e fòrça umits. Açò s'aplique tanben en còtes nautes.

Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant
enDimèrcles 21 04 2021



Coches fèbles
persistentes



2200m



Nhèu
ventada



2200m

Es coches febles presentes ena part superficial deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se encara en quauqui endrets.

En totes es orientacions, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Especiaument per dessus des 2200 m aproximativament. Es lauegi pòden de manera isolada desencadenar-se damb ua subrecarga febla e arténher mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales arribentes èst a oèst peth sud. De manera isolada tanben enes pales ombrères arribentes e damb pòc celh de nhèu. Es sons isoladi de "whumpf" son possibles senhaus de perilh

Naues e vielhes acumulacions de nhèu ventada se pòden desencadenar sonque de manera isolada. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes orientacions nòrd-oèst a nòrd-èst peth nòrd per dessus des 2200 m aproximativament. Tanben apròp des crestes de totes es orientacions en còtes nautes e zònes de nauta montanha. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles lauegi de nhèu umida sense coesion. Açò s'aplique especiaument enes pales soleienques escarpades.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

Especiaument enes pales arribentes soleienques per dessus des 2200 m aproximativament: De cap ara superfícia, era nhèu presente ua estratificacion desfavorabla, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion qu'arrepòse sus ua crosta. Eth mantèth de nhèu ei procliu ath desencadenament en quauqui endrets. Especiaument enes pales damb acumulacions de nhèu ventada.


Era nhèu recenta dera darrèra setmana e tanben es plaques de vent plaques de vent se tròben ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères.

Eth heiredament nocturn serà temporaument fòrça bon.

Tendència

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perilh de lauegi umits e fòrça umits. Açò s'aplique tanben en còtes nautes.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant
 enDimèrcles 21 04 2021 →



Nhèu ventada



Coches
 fèbles
 persistentes



Limit deth
 bòsc

Nhèu ventada mens recenta apròp des crestes. Es coches fèbles presentes ena part superficial deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se encara en quauqui endrets.

Acumulacions de nhèu ventada son principaument mès a lèu petites mès an d'èster avalorades damb suenh. Es lauegi pòden de manèra isolada desencadenar-se damb ua subrecarga febla o naturalment. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp de crestes, conques e canaus de totes es orientacions.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perih de lauegi. Enes pales soleienques fòrça arribentes, a compdar dera maitiada son probables sonque isoladament lauegi de nhèu sense coesion, mès majoritariament petiti. Ath delà i a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.10: scenari de primavera

Eth mantèth de nhèu vielh ei ben consolidat de manèra generalizada. De cap ara superficial, era nhèu presente ua estratificacion desfavorabla, damb ua superficial formada per nhèu de febla coesion qu'arrepòse sus ua crosta.

Era nhèu recenta dera darrèra setmana e es plaques de vent plaques de vent se tròben ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères. Eth ligam entre es diüerses plaques de vent ei ja fòrça bon. Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors lèu absent.

Tendència

Es condicions de temps causaràn ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perih de lauegi umits e fòrça umits.