






## AM




## PM





## Grad de perilh 2 - Moderat

**AM:**

**Tendéncia: aument deth perilh de lauegi**  
en Dissabte 24 04 2021



Coches fèbles  
persistentes

**PM:**

**Tendéncia: aument deth perilh de lauegi**  
en Dissabte 24 04 2021



Coches fèbles  
persistentes



Nhèu umida



Nhèu umida

Lauegi fòrça umits ath long deth dia. Coches febles persistentes especiaument enes pales ombrères extrèmes.

A prumèra ora deth maitin i aurà generaument condicions de lauegi mès a lèu favorables, a compdar d'alavetz augmentarà eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son possibles lauegi de nhèu fòrça umida. Principaument enes pales soleienques escarpades per dejós des 2800 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Es excursions de montanya an de finalizar ara ora.

Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Principaument enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessús des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden en quauqui endrets desencadenar-se aumens per ua subrecarga fòrta e arténher mida mejana.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primauera

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi fòrça bon. A compdar deth maitin eth solei e era calor causaràn especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2800 m aproximativament ua rapida umidificacion deth mantèth de nhèu. Aço s'aplique tanben enes pales ombrères arribentes per dejós des 2400 m aproximativament.




De cap ara superfícia, era nhèu presente ua estratificacion desfavorabla. Sustot enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessús des 2400 m aproximativament. En còtes baishes non i a qu'un shinhau de nhèu.

## Tendéncia

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, augment deth perilh de lauegi umits e fòrça umits. Tanben en cas de desencadenaments originadi en zònes de gessuda ombrères.



## Grad de perilh 2 - Moderat

**AM:**

**Tendéncia: aument deth perilh de lauegi**  
en Dissabte 24 04 2021

**PM:**

**Tendéncia: aument deth perilh de lauegi**  
en Dissabte 24 04 2021



Coches febles persistentes especiaument enes pales ombrères extrèmes.  
Atencion as purgues e lauegi de nhèu fòrça umida.

Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles trendes. Principaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2500 m aproximativament. Es lauegi pòden de manèra fòrça isolada desencadenar-se damb ua subrecarga febla e arténher mida mejana.

A prumèra ora deth maitin i aurà generaument condicions mès a lèu favorables, a compdar d'alavetz augmentarà eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son possibles lauegi de nhèu fòrça umida. Principaument enes pales soleienques escarpades per dejós des 2800 m aproximativament.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primauera

De cap ara superfícia, era nhèu presente ua estratificacion desfavorable. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2500 m aproximativament.

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. A compdar deth maitin eth solei e era calor causaràn especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2800 m aproximativament ua rapida umidificacion deth mantèth de nhèu. En còtes baishes non i a qu'un shinhau de nhèu.

## Tendéncia



A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, progressiu augment deth perilh de lauegi umits e fòrça umits. Tanben en cas de desencadenaments originadi en zònes de gessuda ombrères.




## Grad de perilh 2 - Moderat

**AM:**

**Tendéncia: aument deth perilh de lauegi**  
en Dissabte 24 04 2021



Nhèu umida

**PM:**

**Tendéncia: aument deth perilh de lauegi**  
en Dissabte 24 04 2021



Nhèu umida

Damb era pujada des temperatures diürnes e era radiacion solara, son possibles purgues e lauegi de nhèu fòrça umida.

A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, progressiu augment deth perilh de lauegi. Enes pales soleienques fòrça arribentes, a compdar dera maitiada son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu umida e fòrça umida, tanben de mida mejana. Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau.

Acumulacions de nhèu ventada mès vielhes son en generau facilament identificables e an d'èster avalorades damb suenh. Es endrets perilhosí se tròben sustot apròp de crestes, conques e canaus de totes es orientacions.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primauera

De cap ara superfícia, era nhèu ei umida, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion qu'arrrepòse sus ua crosta. Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. A compdar deth maitin eth solei e era calor causaràn especialment enes pales soleienques arribentes ua rapida umidificacion deth mantèth de nhèu. En còtes baishes non i a qu'un shinhau de nhèu.

### Tendéncia



A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, progressiu augment deth perilh de lauegi umits e fòrça umits.



## Grad de perilh 2 - Moderat

**AM:**

**Tendéncia: aument deth perilh de lauegi**  
en Dissabte 24 04 2021

**PM:**

**Tendéncia: aument deth perilh de lauegi**  
en Dissabte 24 04 2021



Nhèu umida

2600m



2600m



Nhèu umida

2400m



2400m

Lauigi fòrça umits ath long deth dia.

Dempús d'ua net serena, eth maitin anarà seguit per generaument condicions de lauegi mès a lèu favorables, a compdar d'alavetz augmentarà eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son possibles lauegi de nhèu fòrça umida. Principaument enes pales soleienques escarpades per dejós des 2800 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Principaument enes pales extrèmament arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es lauegi pòden desencadenar-se damb ua subrecarga febla e arténher mida mejana, açò s'aplique sustot a compdar de meddia.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primauera

Eth mantèth de nhèu ei estable ena majoria de casi. Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors fòrça bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta e s'atrendirà ath long deth dia. A compdar dera tarde eth solei e era calor causaràn especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2800 m aproximativament ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique tanben enes pales ombrères arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. En còtes baishes non i a qu'un shinhau de nhèu. Sustot enes pales soleienques.

## Tendéncia

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, aument deth perilh de lauegi.