




AM



PM





Grad de perilh 1 - Fèble



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDijaus 29 04 2021

Era situacion de lauegi qu'ei favorabla en fòrça endrets. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perilh de lauegi fòrça umits.

Actuaument i a condicions de lauegi favorables.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi fòrça umits aumentarà leugèrament. Son possibles lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion, mès majoritariament petiti.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors fòrça bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'atrendirà ath long deth dia.


En còtes baishes non i a qu'un shinhau de nhèu. Sustot enes pales soleienques.

Tendència

En cors dera jornada leugèr augment deth perilh de lauegi umits e fòrça umits.



Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →


enDijaus 29 04 2021



Nhèu umida



Coches
fèbles
persistentes



En cors dera jornada leugèr aument deth perih de lauegi fòrça umits.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn un graduau debilitament deth mantèth de nhèu. Ací eth perih de lauegi fòrça umits aumentarà. Son possibles lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion, mès majoritariament petiti. En quauqui endrets, es lauegi fòrça umidi pòden desencadenar-se enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu ath pas d'un solet montanhaire. Tanben enes pales ombrères.

Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi sequi se tròben enes pales ombrères extrèmament arribentes. Principalement apròp des crestes enes zònes de celh prim en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es lauegi pòden desencadenar-se aumens per ua subrecarga fòrta. Ath delà deth perih d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde tanben eth perih d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta enes còtes nautes e s'atrendirà ath long deth dia.

Enes pales ombrères, ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs gròssi. Sustot per dessus des 2600 m aproximativament enes zònes de celh prim.

En còtes baishes non i a qu'un shinhau de nhèu. Sustot enes pales soleienques.

Tendència


Eth heiredament nocturn serà redusit. Eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida demorarà invariable.



Grad de perih 2 - Moderat

AM:**Tendència: perih de lauegi constant**

enDijaus 29 04 2021 →

PM:**Tendència: perih de lauegi constant**

enDijaus 29 04 2021 →



Nhèu umida



2800m

Era situacion de lauegi qu'ei mès a lèu favorabla en fòrça endrets. A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr aument deth perih de lauegi fòrça umits.

Dempús d'ua net serena, ath maitin es condicions de lauegi son favorabls en fòrça sectors. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perihosa per esguiltades enes pales arribentes. Quauqu'uns endrets perihosi per lauegi sequi se tròben enes pales ombrères extrèmament arribentes. Principalement apròp des crestes enes zònes de celh prim en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Ath delà deth perih d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde tanben eth perih d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perih de lauegi fòrça umits aumentarà leugèrament. Son possibles lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion, mès majoritariament petiti. De manèra isolada, es lauegi fòrça umidi pòden tanben produir un desencadenament enes coches mès pregones. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes entre es 2200 e es 2400 m aproximativament, açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta. Sustot enes zònes de celh prim.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors fòrça bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta. Sustot enes pales soleienques en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'atrendirà ath long deth dia.

Enes pales ombrères, ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs gròssi.



Açò s'aplique especiaument enes zònes de celh prim en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

En còtes baishes non i a qu'un shinhau de nhèu. Sustot enes pales soleienques.

Tendència

En cors dera jornada leugèr aument deth perilh de lauegi umits e fòrça umits.