






Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diendres 07 05 2021



Nhèu ventada



Nhèu umida



En zònes de nauta montanha: Eth problema de nhèu ventada recenta requerís atencion. Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau augmentarà leugèrament ath long deth dia.

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth quadrant oèst , ath long des darrèri dies, en zònes de nauta montanha s'an format plaques de vent a viatges de bon desencadenar. Es endrets perillhos se tròben sustot enes pales ombrères extrèmament arribentes. Precaucion apròp des crestes e enes zònes de celh prim. Es excursions de montanha requerissen ua eleccioón atentiuá der itinerari.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau augmentarà progressivament. Especiaument enes sectors damb fòrça nhèu. Es lauegi fòrça umidi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones e arténher mides mejanes de manera isolada. Açò s'aplique especiaument enes pales ombrères arribentes. Tanben, en quauqui endrets, es lauegi fòrça umidi pòden tanben desencadenar-se enes coches superficiaus deth mantèth. Açò s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2200 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

pp.10: scenari de primauera

En quauqui sectors a compdar de dimèrcles an queigut de 10 a 20 cm de nhèu per dessús des 2200 m aproximativament, locaument enquia 30 cm.

Era nhèu vielha ei fòrça umida. Especiaument per dejós des 2600 m aproximativament.

Era nhèu recenta umida e es plaques de vent formades peth vent der oèst de moderat a fòrt plaques de vent se tròben ath dessús d'un mantèth feble de nhèu vielha especiaument en pales ombrères fòrça arribentes. Açò s'aplique principaument per dessús des 2600 m aproximativament e enes zònes de celh prim.


En còtes nautes e zònes de nauta montanha encara i a fòrça nhèu. En còtes baishes e mejanes non i a qu'un shinhau de nhèu. Sustot enes pales soleienques.

Tendéncia

Problèma de nhèu ventada recenta en còtes nautes. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, progressiu augment deth perilh de lauegi.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDiuendres 07 05 2021 →



Nhèu umida



2200m



Nhèu ventada



2400m

En còtes nautes e en zònes de nauta montanha: Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, augment deth perilh de lauegi.

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi umits e fòrça umits augmentarà progressivament. Sustot enes pales ombrères arribentes es lauegi pòden desencadenar eth mantèth amarat e arténher dimensions fòrça granes. De manèra fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar-se de manèra naturau. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden exposar-se ath perilh.

Es excursions de montanha requerissen ua eleccion atentiuua der itinerari.

Actuaument, eth serviçi de predicción de lauegi a informacion limitada deth terren. Atau donc, cau avalorar atentiuamente eth perilh de lauegi locau.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.10: scenari de primauera

Eth mantèth de nhèu ei umit, damb ua crosta de regèu tot just portanta en superfícia. Sustot enes pales soleienques arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Era nhèu vielha ei fòrça umida.

Especiaument per dejós des 2600 m aproximativament.


En còtes baishes e mejanes non i a qu'un shinhau de nhèu. Sustot enes pales soleienques. En còtes nautes e zònes de nauta montanha encara i a fòrça nhèu. Locaument ath long deth vèspe queirà nhèu enquìas 2000 m.

Tendéncia

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perilh de lauegi.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diuendres 07 05 2021



Eth problème de nhèu umida requerís atencion.

En quauqui endrets, es lauegi fòrça umidi pòden desencadenar-se. Sustot enes pales ombrères. En cors dera jornada, son possibles sonque de manèra isolada lauegi de nhèu fòrça umida de mida petita.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

Era superfícia deth mantèth de nhèu ja s'atrendirà ath maitin. En còtes baishes e mejanes i a un shinhau de nhèu.