


## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: Diminucion deth perih de lauegi**  
enDeluns 20 12 2021



Coches fèbles  
persistentes



Nhèu  
ventada



Eth problèma de coches febles persistentes ac cau evitar. Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.

Es coches febles presentes ena nhèu vieha pòden desencadenar-se e tanben de manèra fòrça isolada ath pas d'un solet montanhaire. Especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques arribentes en zònes de nauta montanha. De manèra fòrça isolada, es lauegi pòden tanben arténher mides granes. Es sons isoladi de "whumpf" son possibles senhaus de perih Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Desfavorables son sustot es endrets de pas de pòca a molta nhèu,. Es pales ombrères fòrça arribentes an d'èster traussades d'un en un.

Ath delà calerie hèr a tier compde damb es plaques de vent clarament visibles. Aguestes darrères son principaument sonque petites mès en quauqui casi favorables ath desencadenament. Endrets perilhosi se tròben en particular en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent e tanben enes endrets ombrèrs emparadi deth vent per dessus des 2200 m aproximativament.

Enes pales soleienques fòrça arribentes, ath long dera jornada son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlamente basau e purgues de nhèu umida.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques en zònes de nauta montanha. Enes zònes de celh prim era probabilitat de desencadenament ei superiora. Es perfius estratigrafics e es tèsti d'estabilitat confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu en aguestes còtes.

Ath delà es plaques de vent mès recentes son locaument favorables ath desencadenament. Eres non s'an estacat ben damb era nhèu vieha sustot en pales ombrères. Acumulacions de nhèu ventada son principaument sonque petites.

Damb es temperatures doces e era radiacion solara, eth mantèth de nhèu s'a consolidat. Damb era pujada de temperatures e, enes darrèri dies s'a format ua crosta superficiau. Sustot enes pales soleienques arribentes per dejós des 2400 m aproximativament, e tanben en totes es orientacions en còtes baixes e mejanes. Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessus deth limit deth bòsc pera influéncia deth vent.



## Tendència

Es condicions deth temps afavoriràn un lent refortiment des coches de nhèu superficiaus. Eth perilh de lauegi sequi disminuirà progressivament. Enes pales ombrères era situacion ei mens favorabla.