


## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant**  
 enDiuendres 24 12 2021 →



Nhèu ventada



Coches  
 fèbles  
 persistentes



Nhèu ventada per dessus des 2200 m aproximativament. Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.

Damb eth vent de moderat a fòrt deth quadrant nòrd, ath long des darrèri dies, per dessus des 2200 m aproximativament s'an format plaques de vent a viatges inestables. Aguestes darrères son en generau facilament identificables e se pòden desencadenar de manèra isolada enes sòns marges. Desfavorables son sustot es endrets de pas de pòca a molta nhèu,. Endrets perilhosi se tròben en particular en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent e tanben enes endrets ombrèrs emparadi deth vent. Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha ath pas d'un solet montanhaire. Especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques arribentes en zònes de nauta montanha. De manèra fòrça isolada, es lauegi pòden tanben arténher mides granes. Es sons isoladi de "whumpf" son possibles senhaus de perih Desfavorables son sustot es endrets damb pòc celh de nhèu,. Es pales ombrères fòrça arribentes e pòc freqüentades an d'èster avalorades damb prudència.

Enes pales soleienques, son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitliment basau. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitliment basau.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques en zònes de nauta montanha. Enes zònes de celh prim era probabilitat de desencadenament ei superiora. Es perfius estratigrafics e es tèsti d'estabilitat confirmen era estabilitat extrèmament variabla a petita escala en aguestes còtes.

Es plaques de vent mès recentes non s'an estacat ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères arribentes.

Damb era pujada de temperatures, s'a format ua crosta superficial. Sustot enes pales soleienques arribentes per dejós des 2800 m aproximativament. Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessus deth limit deth bòsc pera influéncia deth vent. Enes pales soleienques arribents i a mens nhèu dera acostumada. Apròp deth limit deth bòsc, enes zònes ombrères e a sotavent: Eth mantèth de nhèu s'a facetat, damb ua superfícia febla formada per gibra.



## Tendència

Era situacion de lauegi qu'ei mès a lèu favorabla en quauqui endrets. Enes pales ombrères era situacion ei leugèrament mès perilhosa.