





## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant  
enDissabte 25 12 2021



Coches febles persistentes



2200m



Nhèu ventada



Eth problèma de coches febles persistentes requerís atencion. Nhèu ventada per dessús des 2200 m aproximativament.

De manerà isolada, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha per subrecargas febles. Especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques arribentes en zònes de nauta montanha. De manerà fòrça isolada, es lauegi pòden tanben arténher mides granes. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son possibles senhaus de perilh Desfavorables son sustot es endrets damb pòc celh de nhèu,. Es pales fòrça arribentes e pòc freqüentades an d'este avalorades damb prudència.

Damb eth vent de moderat a fòrt deth quadrant nòrd-oèst , ath long des darrèri dies, per dessús des 2200 m aproximativament s'an format plaques de vent a viatges inestables. Aguestes darreres son en generau facilament identificables mès se pòden desencadenar de manerà isolada enes sòns marges. Desfavorables son sustot es endrets de pas de pòca a molta nhèu,. Endrets perilhosos se tròben en particular en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent e tanben enes endrets ombrères emparadi deth vent.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques en zònes de nauta montanha. Es perfius estratigrafics e es tèsti d'estabilitat confirmen era estabilitat extrèmament variabla a petita escala en aguestes còtes.

Es plaques de vent mès recentes non s'an estacat ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères arribentes.

Damb era radiacion solara, s'a format ua crosta superficiau. Sustot enes pales soleienques arribentes per dejós des 2800 m aproximativamente. Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessús deth limit deth bòsc pera influéncia deth vent. Enes pales soleienques arribents i a mens nhèu dera acostumada.

Apròp deth limit deth bòsc, enes zònes ombrères e a sotavent: Eth mantèth de nhèu s'a facetat, damb ua superfícia febla formada per gibra.

Locaument queirà un shinhau de nhèu.

### Tendència



Era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorabla. Enes pales pòc freqüentades e damb pòc celh de nhèu era situacion ei leugèrament mès perilhosa.