






## Grad de perill 2 - Moderat




**Tendència: perill de lauegi constant** →  
en Dissabte 25 12 2021



Coches fèbles  
persistentes



Nhèu  
ventada



**Eth problèma de coches febles persistentes requerís atencion. Nhèu ventada per dessus des 2200 m aproximativament.**

De manera isolada, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha per subrecargues febles. Especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques arribentes en zònes de nauta montanha. De manera fòrça isolada, es lauegi pòden tanben arténher midas granas. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son possibles senhaus de perill Desfavorables son sustot es endrets damb pòc celh de nhèu,. Es pales fòrça arribentes e pòc freqüentades an d'èster avalorades damb prudéncia.

Damb eth vent de moderat a fòrt deth quadrant nòrd-oèst , ath long des darrèri dies, per dessus des 2200 m aproximativament s'an format plaques de vent a viatges inestables. Aguestes darrères son en generau facilament identificables mès se pòden desencadenar de manera isolada enes sòns marges. Desfavorables son sustot es endrets de pas de pòca a molta nhèu,. Endrets perilhosi se tròben en particular en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent e tanben enes endrets ombrèrs emparadi deth vent.

## Celh de nhèu

### Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques en zònes de nauta montanha. Es perfius estratigrafics e es tèsti d'estabilitat confirmen era estabilitat extrèmament variabla a petita escala en aguestes còtes.

Es plaques de vent mès recentas non s'an estacat ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères arribentes.

Damb era radiacion solara, s'a format ua crosta superficial. Sustot enes pales soleienques arribentes per dejós des 2800 m aproximativament. Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessus deth limit deth bòsc pera influéncia deth vent. Enes pales soleienques arribents i a mens nhèu dera acostumada.

Apròp deth limit deth bòsc, enes zònes ombrères e a sotavent: Eth mantèth de nhèu s'a facetat, damb ua superfícia febla formada per gibra.

Locaument queirà un shinhau de nhèu.

## Tendéncia



Era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorabla. Enes pales pòc freqüentades e damb pòc celh de nhèu era situacion ei leugèrament mès perilhosa.