





Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDijaus 10 03 2022



Es condicions entàs excursions son favorables.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, a compdar de meddia eth perilh de lauegi fòrça umits aumentarà leugèrament. Sustot enes pales soleienques arribentes, son possibles de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida de mida petita a mejana. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.2: esguitlament de nhèu)

Eth mantèth de nhèu ei estable en fòrça endrets.

Enes pales soleienques: Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn enes pales soleienques arribentes ua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Enes pales ombrères: Era part superiora deth mantèth ei trenda, damb ua superfícia trasformada a cristaus facetadi.

Tendéncia

Perilh feble (1) de lauegi. Damb era pujada des temperatures diürnes e era radiacion solara, son encara possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida de mida petita a mejana.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDijaus 10 03 2022



Es condicions entàs excursions son majoritàriament favorables.

De manèra fòrça isolada, es lauegi pòden desencadenar-se ena nhèu vielha sustot per subrecargues fòrtes. Aço s'aplique enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2400 m aproximativament. Sustot enes terren pòc freqüentades enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Es lauegi pòden arténher mides mejanes. Es pales ombrères extrèmament arribents an d'estèr trauessades d'un en un.

Ath delà eth perilh de lauegi fòrça umits aumentarà a compdar de meddia. Especialment enes pales soleienques arribentes, son possibles lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion de mida petita a mejana. Enes sectors damb fòrça nhèu, son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.7: zònes prauves de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei estable en fòrça endrets.

Enes pales ombrères: Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles. Sustot per dessús des 2400 m aproximativament. Era part superiora deth mantèth ei tendra, damb ua superfícia trasformada a cristaus facetadi.

Enes pales arribentes soleienques, en còtes mejanes e nautes: Ath long dera jornada era radiacion solara causarà ua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Perilh feble (1) de lauegi. Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits ath long deth dia aumentarà leugèrament.