



AM




PM



Grad de perilh 3 - Mercat


AM:



Tendència: Diminucion deth perilh de lauegi
enDiuendres 18 03 2022



PM:



Tendència: Diminucion deth perilh de lauegi
enDiuendres 18 03 2022



Es condicions de lauegi son primaueraus.

A prumèra ora deth maitin i aurà provisionaument condicions de lauegi en quauqui casi favorables. Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau aumentarà ja ath long dera maitiada. En cors dera jornada, son possibles cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau de mida mejana e, locaument, grana. Açò s'aplique principaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2800 m aproximativament, e tanben en totes es orientacions en còtes mejanes. Precaucion sustot enes zònes de celh prim. Ací eth mantèth de nhèu ei mès feble. Es lauegi fòrça umits pòden encara desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arribar a mida perilhosament grana. Es excursions de montanha an de començar e acabar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.2: esguitlament de nhèu

Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atrendirà rapidament. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn en particular enes pales soleienques arribentes per dejós des 2800 m aproximativament un rapid amarament deth mantèth de nhèu. Enes zònes de celh prim eth mantèth de nhèu s'estovarà mès rapidament.


Es plaques de vent de mida petita dera dimenjada non son ja inestables.

Es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. Sustot als sectors deth sud e tanben en còtes baishes e mejanes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendència

Damb eth heiredament, leugèr afebliment deth perilh de lauegi fòrça umits.

Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: Diminucion deth perilh de lauegi
enDiuendres 18 03 2022



Es condicions de lauegi son primaueraus.

A prumèra ora deth maitin i aurà provisionaument condicions de lauegi mès a lèu favorables. Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau aumentarà ja ath long dera maitiada. En cors dera jornada, son possibles cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau de mida mejana. Açò s'aplique principaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben en totes es orientacions en còtes mejanes. Precaucion sustot enes zònes de celh prim. Ací eth mantèth de nhèu ei mès feble. Es lauegi fòrça umits pòden encara desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arribar a mida perilhosament grana. Es excursions de montanha an de començar e acabar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.2: esguitlament de nhèu

Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atendirà rapidament. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn en particular enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament un rapid amarament deth mantèth de nhèu. Enes zònes de celh prim eth mantèth de nhèu s'estovarà mès rapidament.

Es plaques de vent de mida petita dera dimenjada non son ja inestables.

Es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. Sustot als sectors deth sud e tanben en còtes baixes e mejanes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendència

Damb eth heiredament, leugèr afebliment deth perilh de lauegi fòrça umits.