






AM




PM






Grad de perilh 3 - Mercat

AM:**Tendéncia: perilh de lauegi constant**

enDimenge 20 03 2022

**PM:****Tendéncia: perilh de lauegi constant**

enDimenge 20 03 2022



A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, augment deth perilh de lauegi umits e fòrça umits.

A prumèra ora deth maitin i aurà provisionaument condicions de lauegi en quauqui casi favorables. Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau aumentarà ja ath long dera maitiada. En cors dera jornada, son possibles cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau de mida mejana e, locaument, grana. Açò s'aplique principaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben en totes es orientacions en còtes mejanies. Precaucion sustot enes zònes de celh prim. Ací eth mantèth de nhèu ei mès feble. Es lauegi fòrça umits pòden encara desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire. Damb era pujada des temperatures e era radiacion solara, era activitat de lauegi fòrça umits naturaus diminuirà.

Es excursions de montanya an de començar e acabar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.2: esguitlament de nhèu

Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atrendirà rapidament. Ath long dera jornada eth solei e era calor causarà en particular enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament un rapid amarament deth mantèth de nhèu. Enes zònes de celh prim eth mantèth de nhèu s'estovarà mès rapidament.

Es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Sustot als sectors deth sud e tanben en còtes baishes e mejanies peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendéncia


Dempús d'ua net serena, ath maitin es condicions son mès a lèu favorables. Damb era pujada des temperatures diürnes e era radiacion solara, son possibles cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu fòrça



umida e d'esquitlament basau de mida mejana.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimenge 20 03 2022 →

Encara possibles lauegi de nhèu fòrça umida de mida petita e mejana.

Es lauegi fòrça umits pòden en quauqui endrets desencadenar-se ath pas d'ua persona e arténher mida mejana. Açò s'aplique enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben en totes es orientacions en còtes mejanes. Precaucion sustot enes zònes de celh prim. Ací eth mantèth de nhèu ei mès feble. Damb era pujada des temperatures e era radiacion solara, era activitat de lauegi fòrça umits naturaus diminuirà.

Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau. Açò s'aplique enes pales erbosees arribentes enes sectors damb fòrça nhèu.

Es excursions de montanya an de començar e acabar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.10: scenari de primauera)

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atrendirà rapidament. Ath long dera jornada eth solei e era calor causarà en particular enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament un rapid amarament deth mantèth de nhèu. Enes zònes de celh prim eth mantèth de nhèu s'estovarà mès rapidament.


Es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Sustot als sectors deth sud e tanben en còtes baishes e mejanes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendéncia

Ath maitin es condicions son mès a lèu favorables. Damb era pujada des temperatures diürnes e era radiacion solara, son possibles de manèra isolada purgues e lauegi de nhèu fòrça umida.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimenge 20 03 2022 →

En fòrça endrets non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.
Eth problema de nhèu umida requerís atencion.

Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tot just e ja s'atrendirà ath maitin. Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau demorarà invariable. Sustot enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst. Es lauegi son aumens sonque de mida petita mès en quauqui casi ja pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire. Precaucion sustot enes zònes de celh prim. En Latemar, es endrets perilhosí son un shinhau mès freqüenti e eth perilh ei mès gran.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.10: scenari de primauera)

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atrendirà rapidament. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn en particular enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament un rapid amarament deth mantèth de nhèu. Enes zònes de celh prim eth mantèth de nhèu s'estovarà mès rapidament.

Sustot als sectors deth sud e tanben en còtes baishes e mejanas peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendéncia

Ath maitin es condicions son mès a lèu favorables. Damb era pujada des temperatures diürnes e era radiacion solara, son possibles de manèra isolada purgues e lauegi de nhèu fòrça umida.