AM

PM



Grad de perilh 2 - Moderat

AM:

Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimenge 2 03 2022

PM:

2400m

Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimenge 2 03 2022

2400m

Nhèu umida

Eth perilh de lauegi aumentarà leugèrament ath long deth dia.

Dempús d'ua net serena, eth maitin anarà seguit per generaument condicions favorables. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perilh de lauegi aumentarà leugèrament. Damb era umidificacion, son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu fòrça umida, mès majoritariament petiti, açò s'aplique pera subrecarga d'un unic montanhaire. Sustot enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2400 m aproximativament. Ath delà son possibles de manèra fòrça isolada lauegi d'esguitlament basau e purgues.
Es excursions de montanha an de finaliar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perilh pp.10: scenari de primauera

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta e s'atrendirà ath long deth dia. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn enes pales soleienques fòrça arribentes un debilitament deth mantèth de nhèu.
a mens nhèu dera acostumada.

Tendéncia

Es condicions demoren primaueraus. En cors dera jornada leugèr aument deth perilh de lauegi fòrça umits.

> Es condicions son primaueraus. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, aument deth perilh de lauegi fòrça umits.

Grad de perilh 1 - Fèble

AM:



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimèrcles 13 04 2022

PM:



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimèrcles 13 04 2022

Nhèu umida



A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, aument deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

Dempús d'ua net serena, ath maitin es condicions de lauegi son favorables en fòrça sectors. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, a compdar de meddia eth perilh de lauegi fòrça umits aumentarà. Damb era penetracion dera umitat, son possibles quauqu'uns lauegi fòrça umits sense coesion de mida petita e, locaument, mejana.
Ath delà eth perilh de lauegi d'esguitlament basau aumentarà ath long dera jornada. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perilh pp.10: scenari de primauera

Eth dimars serà fòrça doç Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta. Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn un clar debilitament deth mantèth de nhèu. Per dejós deth limit deth bòsc peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendéncia

Es condicions son primaueraus. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, aument deth perilh de lauegi fòrça umits.