





## AM



## PM



## Grad de perilh 2 - Moderat

AM:



2600m

**Tendència: perilh de lauegi constant**  
enDimèrcles 13 0 2022

2600m

Coches fèbles  
persistentes

PM:

**Tendència: perilh de lauegi constant**  
enDimèrcles 13 0 2022

Nhèu umida

2600m

Coches fèbles  
persistentes

En altitud, es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se en quauqui endrets. En cors dera jornada perilh moderat (2) de lauegi fòrça umits.

Es coches febles presentes ena part superficiau deth mantèth de nhèu requerissen precaucion Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères per dessus des 2600 m aproximativament e tanben enes pales soleienques per dessus des 200 m aproximativament. Es lauegi pòden en quauqui casi desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arribar a mida perilhosament grana. Es endrets perilhosi son de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi fòrça umits aumentarà. Açò s'aplique especiaument enes pales orientades a oèst, sud e èst en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2200 m aproximativament. Ath delà i a un cèrt perilh de lauegi d'esguitlament basau. Açò s'aplique especiaument enes pales erbozes arribentes enes sectors damb fòrça nhèu. Es excursions de montanha, es baishades dehòra de pista e es accèssi tàs refugis an de començar e acabar ara ora.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.: heired dessus de caud caud dessus de heired

pp.10: scenari de primavera

Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Açò s'aplique especiaument

enes pales ombrères arribentes per dessús des 2600 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques arribentes per dessús des 200 m aproximativament. Es desencadenaments de lauegi naturaus e es rapòrts des observadors confirman aguesta situacion.

Eth dimars serà fòrça doç. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e s'atendirà ja ath long deth maitin. Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn un clar debilitament deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique enes pales soleienques arribentes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2200 m aproximativament. Sustot en còtes baishes e mejanes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

## Tendéncia

Es condicions son primaueraus. A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, augment deth perilh de lauegi fòrça umits.

## Grad de perilh 2 - Moderat

**AM:**

**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
enDimèrcles 13 0 2022

**PM:**

**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
enDimèrcles 13 0 2022

Nhèu umida

### En cors dera jornada perilh moderat (2) de lauegi fòrça umits.

A prumèra ora deth maitin i aurà aumens condicions mès a lèu favorables. Es acumulacions de nhèu ventada mens recents se pòden, de manèra isolada, desencadenar en pales ombrères per dessús des 2600 m aproximativament. Eres saurien evitar en pales fòrça dretes.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi fòrça umits aumentarà. Açò s'aplique especiaument enes pales orientades a oèst, sud e èst en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2200 m aproximativament. Ath delà i a un cèrt perilh de lauegi d'esguitlament basau. Açò s'aplique especiaument enes pales erbozes arribentes enes sectors damb fòrça nhèu. Es excursions de montanha, es baishades dehòra de pista e es accèssi tàs refugis an de començar e acabar ara ora.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primavera

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es acumulacions de nhèu ventada s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha. Eres son, de manèra isolada, encara inestables en altitud.

Eth dimars serà fòrça doç. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn un clar debilitament deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique enes pales soleienques arribentes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2200 m aproximativament. Sustot en còtes baishes e mejanes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

### Tendéncia

Es condicions son primaueraus. A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, aument deth perilh de lauegi fòrça umits.

## Grad de perilh 1 - Fèble

AM:



Tendéncia: perilh de lauegi constant

enDimèrcles 13 0 2022




PM:



Tendéncia: perilh de lauegi constant

enDimèrcles 13 0 2022



Nhèu umida



A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, aument deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

Dempús d'ua net serena, ath maitin es condicions de lauegi son favorables en fòrça sectors. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, a compdar de meddia eth perilh de lauegi fòrça umits aumentarà. Damb era penetracion dera umitat, son possibles quauqu'uns lauegi fòrça umits sense coesion de mida petita e, locaument, mejana.

Ath delà eth perilh de lauegi d'esguitlament basau aumentarà ath long dera jornada. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

## Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

Eth dimars serà fòrça doç. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta. Ath long dera jornada es condicions de temps primaverau causaràn un clar debilitament deth mantèth de nhèu. Per dejós deth limit deth bòsc peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

## Tendéncia

Es condicions son primaveraus. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, aument deth perilh de lauegi fòrça umits.