




## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
enDijaus 05 01 2023 →



Coches fèbles persistentes



Snowpack stability: poor  
Frequency: few  
Avalanche size: medium

Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.

En quauque endret es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha feble e, de manèra isolada, arténher mida mejana. Es endrets perilhosí se tròben sustot enes pales arribentes oèst a èst per nòrd per dessús des 2400 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessús des 2600 m aproximativament. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregón. Es endrets perilhosí aumentaràn damb era altitud.

Acumulacions de nhèu ventada son principaument petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes en altitud.

A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perilh d'esquitlar e quèir.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistentea prigonda

Era part inferior deth mantèth s'a facetat, sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2400 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.

Es plaques de vent diuèrses repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères.


De cap ara superfícia, era nhèu ei dura, damb ua crosta de regèu en superfícia. Aço se da especiaument enes pales soleienques arribentes.

### Tendéncia

Especiaument ath nòrd-oèst eth dijaus queirà un shinhau de nhèu. Eth vent serà de moderat a fòrt. Eth mantèth de nhèu vielh demore procliu ath desencadenament en quauqui endrets. Eth perilh de lauegi de nhèu seca augmentarà leugèrament ath nòrd-oèst.



## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
enDijaus 05 01 2023



### Perilh feble (1) de lauegi.

De manèra fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha feble. Es endrets perilhosí se tròben sustot enes pales arribentes oèst a èst peth nòrd.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles sonque isoladament purgues de nhèu umida. Es lauegi son aumens de mida petita.

### Celh de nhèu

En fòrça endrets i a un shinhau de nhèu. Per dejós des 1800 m aproximativament en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Era part inferior deth mantèth s'a facetat, sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst.

De cap ara superfícia, era nhèu ei dura, damb ua crosta de regèu non portanta en superfícia. Perilh feble (1) de lauegi.

### Tendéncia

En quauqui sectors eth dijaus serà soleienc Eth vent serà de moderat a fòrt. Eth perilh de lauegi demorarà invariable.