



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDijaus 02 03 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
Frecuècia: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **regular**
Frecuècia: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion. Coches febles persistentes per dessus des 2200 m aproximativament.

Es plaques de vent recentes e antigues aurièn d'èster avalorades damb prudència sustot en pales ombrères arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Es plaques de vent son mès granes enes sectors damb fòrça nhèu.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben de manèra fòrça isolada ath pas d'un solet montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2200 m aproximativament e tanben enes transicions de celh prim a grossut.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt de direccion variabla, ath long des darrèri dies, en totes es orientacions s'an format plaques de vent. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable, especiaument enes pales ombrères.

Sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben, de manèra isolada, coches febles inestables, sustot entre es 2200 e es 2600 m aproximativament.

Tendència

Eth ligam damb era nhèu vielha des diuèrses plaques de vent ei locaument encara desfavorable, especiaument enes pales ombrères arribentes en altitud.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →

enDijaus 02 03 2023

Predominen en generau condicions favorables.

Un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt de manèra isolada e pro desencadenar lauegi. Es endrets perilhosi per lauegi de nhèu seca se tròben sustot enes pales ombrères extrèmament arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Aguesti son fòrça rari mès de mau reconéisher.

A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perih d'esguitlar e queirà en fòrça lòcs.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable, damb ua crosta grossuda portanta en superfícia. Ath long dera jornada era radiacion solara causarà ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu, sustot en còtes baishes e mejanes.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament e enes pales soleienques en altitud.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres per dessus deth limit deth bòsc. En fòrça endrets peth moment i a pòca nhèu.

Locaument a compdar dera tarde queirà pòca nhèu.

Tendència

Es condicions entàs excursions demoren generauement favorables.