





Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant
enDijaus 09 03 2023 →



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Pògui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Damb eth vent de fòrt a plan fòrt der oèst , se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Aguesti endrets perilhosi se tròben sustot enes pales fòrça arribentes orientades a nòrd-oèst, nòrd e èst per dessús deth limit deth bòsc.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi pòden desencadenar-se enes coches basaus deth mantèth de nhèu en còtes nautes. Aguesti endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Precaucion sustot apròp des crestes. Aguesti son fòrça rari mès de mau reconéisher.

A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perilh d'esguitlar e quèir en fòrça lòcs.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Locaument queirà un shinhau de nhèu. Era pòca nhèu recenta e plaques de vent en generau petites formades pendent era nheuada se depositaràn ath dessús d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha en pales ombrères.


Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles, especiaument enes pales ombrères en còtes nautes enes zònes de celh prim.

Ath long dera jornada es condicions de temps causaràn en quauqui casi ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu, especiaument en còtes mejanes.

Tendència

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →

enDijaus 09 03 2023



Plaques de vent



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **regular**

Frecuècia: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

Se manten perih feble (1) de lauegi.

Un practicant d'espòrts d'iuèrn ja dificilament pòt desencadenar lauegi.

Es naues acumulacions de nhèu ventada aurièn d'avalorar-se damb prudència en terren extrem, sustot enes pales ombrères extrèmament arribentes.

De manèra fòrça isolada, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha en còtes nautes. Aguesti endrets perihosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Aguesti son fòrça rari mès de mau reconéisher.

A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perih d'esguitlar e quèir enes pales arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Locaument queirà un shinhau de nhèu. Era pòca nhèu recenta e plaques de vent en generau petites formades pendent era nheuada se depositaràn ath dessús d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha en pales ombrères.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles, especiaument enes pales ombrères arribentes en còtes nautes.

Ath long dera jornada es condicions de temps causaràn en quauqui casi ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu, especiaument en còtes mejanes.

Tendència

Se manten perih feble (1) de lauegi. Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.