




Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDissabte 11 03 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Damb eth vent de fòrt a plan fòrt der oèst , se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Aguesti endrets perilhosi se tròben sustot en pales orientades a nòrd-oèst peth nòrd enquiar èst per dessus des 2200 m aproximativament, sustot enes pales fòrça arribentes. En nautada, es endrets perilhosi son mès freqüenti.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi pòden desencadenar-se enes coches basaus deth mantèth de nhèu en còtes nautes. Aguesti endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Precaucion sustot apròp des crestes. Aguesti son fòrça rari mès de mau reconéisher.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

En quauqui sectors queirà un shinhau de nhèu. Ar oèst queirà 20 cm de nhèu, locaument mès. Es plaques de vent mès recentes repòsen locaument ath dessus de gibra de superfícia especiaument en pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles, especiaument enes pales ombrères en còtes nautes enes zònes de celh prim.


Ath long dera jornada es condicions de temps causaràn ua umidificacion deth mantèth de nhèu, especiaument en còtes mejanes e nautes.

Tendència

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. (-) son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense coesion aumens de mida petita.



Grad de perih 1 - Fèble

**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDissabte 11 03 2023



Plaques de vent



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **regular**Frecuència: **Pògui**Mesura de lauet: **Petit**

Problèma de nhèu ventada recenta en còtes nautes.

Es naues acumulacions de nhèu ventada aurièn d'avalorarse damb prudència en pales ombrères fòrça arribentes en altitud.

De manèra fòrça isolada, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha en còtes nautes. Aguesti endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Aguesti son fòrça rari mès de mau reconéisher.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Era nhèu ventada arrepòse en part ath dessús de coches trendes, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles, especiaument enes pales ombrères arribentes en còtes nautes.

Ath long dera jornada es condicions de temps causaràn ua umidificacion deth mantèth de nhèu, especiaument en còtes mejanes e nautes.

Tendència

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. (-) son probables lauegi de nhèu sense coesion aumens de mida petita.