


Grad de perih 3 - Mercat



Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion. A conseqüència dera radiacion solara, aument deth perih de lauegi.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se encara de manèra fòrça isolada, açò se da tanben ath pas d'un unic montanhaire. Precaucion sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst per dessus des 2400 m aproximativament, sustot enes pales pòc freqüentades orientades a nòrd-èst e èst.

Net: Damb era ploja, son possibles lauegi naturaus de nhèu fòrça umida de mida petita per dejós des 2200 m aproximativament. Açò se da espciaument enes pales ombrères.

En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà. Damb era radiacion solara, era activitat de lauegi naturaus disminuirà. Açò se da espciaument enes pales fòrça arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2400 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perih (pp.1: cocha fèbla persistena prigonda)

Enes següentes ores queirà ploja enquiàs 2000 m. Queirà locaument enquia 15 cm de nhèu per dessus des 2000 m aproximativament.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessus des 2400 m aproximativament.

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atendirà ath long deth dia, espciaument en còtes mejanes. I a pòca nhèu en còtes baishes. Eth mantèth de nhèu ei umit en còtes baishes e mejanes.

Tendència



Dimars: A consequència der augment dera temperatura diürna, escàs augment deth perilh de lauegi.

Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: Diminuci3n deth perih de lauegi
enDimars 21 03 2023



Coches fèbles
persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: [prabe](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atenci3n. Lauegi de nhèu umida ath long deth dia.

Es coches febles ena nhèu vieha pòden desencadenar-se e tanben ara ath pas d'un montanhaire, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst e oèst per dessús des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vieha feble e arténher mida mejana. Precaucion enes pales pòc freqüentades orientades a nòrd-èst e èst.

En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà, esepciaument enes pales soleienques per dejós des 2600 m aproximativament.

Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Ath laguens deth mantèth de nhèu vieha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessús des 2400 m aproximativament.

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atendirà ath long deth dia. Aguestes condicions deth temps provocaràn ath long dera jornada un afebliment deth mantèth de nhèu.

Tendència

Eth perih de lauegi de nhèu seca disminuirà progressivament. Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà leugèrament.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →

enDimars 21 03 2023



Coches fèbles
persistentes



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu umida



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Petit**

Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se encara de manèra fòrça isolada, açò se da tanben ath pas d'un unic montanhaire. Precaucion sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst per dessus des 2400 m aproximativament, sustot enes pales pòc freqüentades orientades a nòrd-èst e èst.

Net: Damb era ploja, son possibles lauegi naturaus de nhèu fòrça umida de mida petita per dejós des 2200 m aproximativament. Açò se da especiaument enes pales ombrères.

En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà leugèrament. Açò se da especiaument enes pales fòrça arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2400 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Enes següentes ores queirà ploja enquiàs 2000 m. Queirà locaument enquia 15 cm de nhèu per dessus des 2000 m aproximativament.


Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessus des 2400 m aproximativament.

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atendirà ath long deth dia, especiaument en còtes mejanes. I a pòca nhèu en còtes baishes.

Tendència

Dimars: A conseqüència der augment dera temperatura diürna, escàs augment deth perih de lauegi.

Grad de perih 2 - Moderat



Tend3ncia: perih de lauegi constant →
enDimars 21 03 2023



Coches f3bles
persistentes



Estabilitat deth celh de nh3u: **prau**
Frecu3ncia: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**



Nh3u umida



Limit deth b3sc

Estabilitat deth celh de nh3u: **regular**
Frecu3ncia: **P3gui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth probl3ma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atenci3n. En cors dera jornada son possibles purgues isolades.

Damb eth vent f3rt deth quadrant n3rd-o3st, eth dim3rcles, sustot apr3p des crestes, en canaus e conques s'an format plaques de vent a viatges inestables. En nautada es endrets perilhosi son m3s nombrosi. En z3nes de transici3n de celh prim a grossut era probabilitat de desencadenament ei major. Es lauegi p3den desencadenar-se ena nh3u vielha de man3ra isolada ja per subrecargues febles. Aç3 se da esepciaument enes pales ombr3res f3rça arribentes. Precaucion en z3nes de transici3n de celh prim a grossut.

Damb era pujada dera temperatura di3rna e era radiaci3n solara, son probables de man3ra isolada purgues de nh3u umida ath long deth dia aumens de mida petita. Aç3 se da esepciaument enes pales soleienques, e tanben enes pales ombr3res per dej3s des 2200 m aproximativament.

Celh de nh3u

Eth ligam damb era nh3u vielha des plaques de vent ei locaument encara desfavorable. En quauqui endrets era nh3u ventada arrep3se ath dessus d'ua crosta dura.


Espciaument enes pales ombr3res, ath laguens deth mant3th de nh3u vielha se tr3ben coches febles isolades. Aç3 se da per dessus des 2200 m aproximativament.

Ath long dera jornada era radiaci3n solara causarà en particular enes pales soleienques ua graduau umidificaci3n deth mant3th de nh3u. Agustes condicions provocaràn un afebliment deth mant3th de nh3u.

Tend3ncia

Eth dimars serà soleienc A conseqü3ncia der augment dera temperatura di3rna e era radiaci3n solara, progressiu augment deth perih de lauegi.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimars 21 03 2023



Coches fèbles
persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: [prabe](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se encara ath pas d'un solet montanhaire. Açò se da especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst e oèst per dessus des 2400 m aproximativament. Precaucion enes pales ombrères pòc freqüentades.

Ath delà en còtes nautes e nauta montanha es plaques de vent mès antigues pòden de manèra isolada encara desencadenar-se.

En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà, especiaument enes pales soleienques per dejós des 2600 m aproximativament. Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessus des 2400 m aproximativament.

Es acumulacions de nhèu ventada vielhes son, de manèra isolada, encara inestables en còtes nautes e nauta montanha.

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atendirà ath long deth dia. Es condicions deth temps provocaràn ath long dera jornada un leugèr afebliment deth mantèth de nhèu.

Tendència

Eth perih de lauegi de nhèu seca disminuirà progressivament. Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà leugèrament.

Grad de perilh 1 - Fèble



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDimars 21 03 2023

Predominen majoritariament condicions de lauegi favorables.

Es endrets perilhosi isoladi se tròben sustot en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères en còtes nautes.


Celh de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei estable en generau. Peth moment i a pòca nhèu en còtes baishes e mejanes. Locaument queirà un shinhau de ploja. Queirà nhèu per dessus des 2000 m aproximativament.

Tendència

Se manten perilh feble (1) de lauegi.

Grad de perilh 1 - Fèble



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDimars 21 03 2023

Damb era radiacion solara, ath long dera jornada eth perilh de purgues de nhèu umida e fòrça umida aumentarà leugèrament. Eth problèma de nhèu ventada vielha ac cau avalorar damb atencion.

Es plaques de vent des darrèri dies aurien d'èster avalorades damb prudència sustot en pales ombrères arribentes en altitud. Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes s'aurien d'évitar en particular en pales fòrça inclinades, tanben apròp des crestes, en canaus e conques.

Ath long dera jornada era radiacion solara causarà sustot enes pales arribentes en quauqui endrets ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. Damb era pujada dera temperatura diürna, en toti es sectors son possibles quauqu'uns purgues de nhèu umida e fòrça umida aumens de mida petita.

Celh de nhèu

Es plaques de vent majoritàriament de mida petita son en part encara inestables sustot en pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc. Per dessus des 2000 m aproximativament es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. En toti es sectors per dejós des 2000 m aproximativament non i a qu'un shinhau de nhèu.

Ath long dera jornada era radiacion solara causarà ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Tendència

Eth dimars serà soleienc A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, progressiu augment deth perilh de lauegi.