


Grad de perih 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant

enDeluns 24 04 2023



Nhèu umida



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan



Plaques de vent



2000m

Estabilitat deth celh de nhèu: praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan

A conseqüència der augment dera temperatura, augment deth perih de lauegi de nhèu umida e fòrça umida. Es plaques de vent des darrèri dies aurien d'èster avalorades damb prudència.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, augment deth perih de lauegi de nhèu umida e fòrça umida. Sustot enes vessants soleiencs arribentes es lauegi pòden soent arténher mida mejana. Es excursions de montanha e es baishades dehòra de pista an de finalizar ara ora. Es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire. Endrets perilhosi se tròben en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. En zònes aupines, es endrets perilhosi son mès freqüenti. Es plaques de vent aurien d'èster evitades, s'ei possible. Sustot enes pales ombrères, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles. Agustè endrets perilhosi son fòrça rari e donques de mau reconéisher.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

En ua zòna grana a compdar de dijaus an queigut de 15 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn sustot enes pales soleienques arribentes ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. Es plaques de vent a viatges caperades de nhèu recenta des darrèri dies demoren encara inestables en còtes mejanes e nautes.

Sustot enes pales ombrères, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles.

Tendència

Queirà en periòde enquiath deluns de 5 a 10 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament, locaument mès.

Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →

enDeluns 24 04 2023



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **regular**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

A conseqüència der augment dera temperatura, augment deth perih de lauegi de nhèu umida e fòrça umida.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, a compdar dera maitiada son probables purgues e lauegi de nhèu fòrça umida, principaument enes pales arribentes.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen ua eleccion detalhada der itinerari.

Celh de nhèu

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn sustot enes pales arribentes ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. En toti es sectors en còtes baishes e mejanes non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendència

Queirà en periòde enquiath deluns de 5 a 10 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament, locaument mè.