




Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDeluns 24 04 2023 →



Nhèu umida



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan



Plaques de vent



2000m

Estabilitat deth celh de nhèu: praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan

A conseqüéncia der augment dera temperatura, augment deth perilh de lauegi de nhèu umida e fòrça umida. Es plaques de vent des darrèri dies aurien d'èster avalorades damb prudència.

A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, augment deth perilh de lauegi de nhèu umida e fòrça umida. Sustot enes vessants soleiens arribentes es lauegi pòden soent arténher mida mejana. Es excursions de montanya e es baishades dehòra de pista an de finalizar ara ora.

Es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire. Endrets perilhosí se tròben en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. En zònes aupines, es endrets perilhosí son mès freqüenti. Es plaques de vent aurien d'èster evitades, s'ei possible.

Sustot enes pales ombrères, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles. Aguesti endrets perilhosí son fòrça rari e donques de mau reconéisher.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

En ua zòna grana a compdar de dijaus an queigut de 15 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn sustot enes pales soleienques arribentes ua progressiuia umidificacion deth mantèth de nhèu. Es plaques de vent a viatges caperades de nhèu recenta des darrèri dies demoren encara inestables en còtes mejanas e nautes.


Sustot enes pales ombrères, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles.

Tendéncia

Queirà en periòde enquiat deluns de 5 a 10 cm de nhèu per dessús des 1800 m aproximativament, locaument mès.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDeluns 24 04 2023 →



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **regular**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

A conseqüéncia der aument dera temperatura, augment deth perilh de lauegi de nhèu umida e fòrça umida.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, a compdar dera maitiada son probables purgues e lauegi de nhèu fòrça umida, principaument enes pales arribentes.

Es excursions de montanya e es activitats dehòra de pista requerissen ua eleccion detalhada der itinerari.

Celh de nhèu

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn sustot enes pales arribentes ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. En toti es sectors en còtes baishes e mejanies non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendéncia

Queiràn en periòde enquiat deluns de 5 a 10 cm de nhèu per dessús des 1800 m aproximativament, locaument mès.