

Grad de perih 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant
enDimenge 11 02 2024



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Atencion a era nhèu recenta e era nhèu ventada.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades plan fòrtes deth quadrant sud-oèst, se formaràn plaques de vent inestables. Agustes ja pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales arribentes per dessus des 2000 m aproximativament, e tanben apròp des crestes, en canaus e conques.

Damb era nheuada intensa, ath long dera jornada son possibles sonque isoladament purgues naturalu de nhèu sense coesion, tanben de mida mejana. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlamente basau. Açò se da especiaument enes pales erbofes arribentes en totes es orientacions principaument per dessus deth limit deth bòsc.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queirà en periòde enquiath dissabte de 15 a 25 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament, locaument mè. Eth vent damb bohades plan fòrtes transportarà intensament era nhèu recenta. Es naues acumulacions de nhèu ventada se depositaràn ath dessus d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha en totes es orientacions en totes es còtes. Era part inferior deth mantèth consistís en cristaus facetadi.

Tendència


Locaument queirà en periòde enquiath dimenge de 10 a 15 cm de nhèu. Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih. Son possibles quauqu'uns lauegi naturaues aumens de mida petita.

Grad de perih 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant
enDimenge 11 02 2024




Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth quadrant sud, sustot en altitud se formaràn plaques de vent inestables. Aguestes ja pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc, sustot apròp des crestes, en canaus e conques.

Son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau, tanben de mida mejana. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau. Açò se da especiaument enes pales erboses arribentes per dejós des 2600 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu



Queirà de 5 a 15 cm de nhèu per dessus des 1300 m aproximativament, locaument mès. Es plaques de vent aumentaràn de mida adicionaument damb era nhèu recenta e eth fòrt vent. Es naues acumulacions de nhèu ventada se depositaràn ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc.

Era part inferior deth mantèth consistís en cristaus facetadi.

Tendència

Queirà en periòde enquiath dimenge locaument enquia 10 cm de nhèu. Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih. I a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: augment deth perih de lauegi
enDimenge 11 02 2024



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth quadrant sud, se formaràn plaques de vent inestables. Aguestes pòden, en quauqui casi, èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire. Es lauegi son en part de mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc, sustot apròp des crestes, en canaus e conques.

Son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau, mès majoritariament petiti. Açò se da especiaument enes pales erboses arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perih


pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queirà enquia 10 cm de nhèu per dessus des 1300 m aproximativament, locaument mès. Es plaques de vent aumentaràn de mida leugèrament damb era nhèu recenta e eth fòrt vent. Es naues acumulacions de nhèu ventada se depositaràn ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc. Era part inferior deth mantèth consistís en cristaus facetadi.

Tendència

Queirà en periòde enquiath dimenge de 5 a 10 cm de nhèu, locaument mès. Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimenge 11 02 2024



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes deth quadrant sud-oèst, en còtes nautas e nauta montanha se formaràn plaques de vent inestables. Aguestes pòden, en quauqui casi, èster desencadenadas ath pas d'un unic montanhaire. Es lauegi pòden arténher midas mejanes. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp de crestes, en canaus e conques. En nautada e enes sectors mès afectadi pes precipitacions, taus endrets perilhosi son mès generalizadi.

Son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau, mès majoritariament petiti. Açò se da especiaument enes pales erboses arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perih



pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Diuendres an queigut de 5 a 15 cm de nhèu, locaument mès. Queirà en periòde enquiath dissabte en una àrea extensa de 5 a 10 cm de nhèu per dessus des 1400 m aproximativament. Eth vent damb bohades fòrtes transportarà era nhèu recenta. Es naues acumulacions de nhèu ventada se depositaràn ath dessus de coches trendes en pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc. Era part inferior deth mantèth consistís en cristaus facetadi.

Tendència

En quauqui sectors enquia dimenge queirà de 5 a 15 cm de nhèu. Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih.

Grad de perill 2 - Moderat



Tendència: augment deth perill de lauegi
enDimenge 11 02 2024



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **prau**e

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Atencion a era nhèu recenta e era nhèu ventada.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades plan fòrtes deth quadrant sud-oèst, se formaràn plaques de vent inestables. Aguestes ja pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales arribentes per dessús des 2000 m aproximativament, e tanben apròp des crestes, en canaus e conques.

Damb era nheuada intensa, ath long dera jornada son possibles sonque isoladament purgues naturalu de nhèu sense coesion, tanben de mida mejana. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau. Açò se da especiaument enes pales erboses arribentes en totes es orientacions principaument per dessús deth limit deth bòsc.

Celh de nhèu

Patrons de perill


pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queirà en periòde enquiath dissabte de 15 a 25 cm de nhèu per dessús des 1800 m aproximativament, locaument mè. Eth vent damb bohades plan fòrtes transportarà intensament era nhèu recenta. Es naues acumulacions de nhèu ventada se depositaràn ath dessús d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha en totes es orientacions en totes es còtes. Era part inferior deth mantèth consistís en cristaus facetadi.

Tendència

Queirà en periòde enquiath dimenge de 10 a 20 cm de nhèu, locaument mè. Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perill.

Grad de perih 2 - Moderat



Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. I a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau.

Per dessus deth limit deth bòsc se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères arribentes, sustot enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es lauegi pòden, de manèra isolada, arténher mides mejanes. En nautada e enes sectors mès afectadi pes precipitacions, taus endrets perilhosi son mès generalizadi.

Son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau, sustot de mida mejana. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau. Açò se da especiaument enes pales erboses arribentes per dejós des 2600 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu


Queirà en periòde enquiath dissabte enquia 15 cm de nhèu per dessus des 1400 m aproximativament, locaument mès. Eth vent fòrt transportarà era nhèu recenta. Es naues acumulacions de nhèu ventada se depositaràn ath dessus de coches trendes en pales ombrères.

Era nhèu vielha ei majoritàriament establa.

Tendència

En quauqui sectors enquia dimenge queirà de 5 a 15 cm de nhèu. Eth vent serà en quauqui casi fòrt. Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih. Ath delà i a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau.

Grad de perill 2 - Moderat



Atencion a era nhèu recenta e era nhèu ventada.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades plan fòrtes deth quadrant sud-oèst, se formaràn plaques de vent inestables. Aguestes ja pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales arribentes per dessús des 2000 m aproximativament, e tanben apròp des crestes, en canaus e conques.

Damb era nheuada intensa, ath long dera jornada son possibles sonque isoladament purgues naturalu de nhèu sense coesion, tanben de mida mejana. Evitar es zònes damb henerècles d'esguiltament basau. Açò se da especiaument enes pales erbofes arribentes en totes es orientacions principaument per dessús deth limit deth bòsc.

Celh de nhèu

Patrons de perill (pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent)

Queirà en periòde enquiath dissabte de 15 a 25 cm de nhèu per dessús des 1800 m aproximativament, locaument mè. Eth vent damb bohades plan fòrtes transportarà intensament era nhèu recenta. Es naues acumulacions de nhèu ventada se depositaràn ath dessús d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha en totes es orientacions en totes es còtes.

Tendència

Queirà en periòde enquiath dimenge de 10 a 20 cm de nhèu, locaument mè. Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perill.

Grad de perillh 1 - Fèble



Tendència: augment deth perillh de lauegi
enDimenge 11 02 2024



Esguitlament
de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prau**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

I a un perillh latent de lauegi d'esguitlament basau.

Son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau, sustot de mida mejana. Açò se da enes pales erbofes arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

En altitud se formaràn plaques de vent de mida petita. Aguestes se pòden desencadenar de manèra isolada. Quauqu'uns endrets perillhosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2600 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth vent damb bohades fòrtes transportarà pòca nhèu e pro. Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable.

Tendència

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, leugèr augment deth perillh de lauegi de nhèu seca. Eth perillh de lauegi d'esguitlament basau demorarà invariable.

Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: augment deth perih de lauegi ↗
enDimenge 11 02 2024



Esguitlament
de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**



Plaques de
vent



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praubè**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Petit**

I a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau. Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

Son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau, sustot de mida mejana. Açò se da enes pales erbozes arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Es naues e es mens recents acumulacions de nhèu ventada son principaument petites mès se pòden desencadenar de manèra isolada. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Dijaus an queigut enquia 10 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament. Eth vent fòrt transportarà era nhèu recenta. Era nhèu vieha ei majoritàriament establa.

Tendència

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, leugèr augment deth perih de lauegi de nhèu seca. Eth perih de lauegi d'esguitlament basau demorarà invariable.