





Grau de Perill 2 - Moderat




Tendència: perill d'allaus en disminució
en Dilluns 19 02 2024



(CC BY avalanche.report)



Capa feble persistent



2400m

Estabilitat del mantell de neu: pobre
freqüència: algunes
Mida d'allau: mitjana



Neu humida



2600m

Estabilitat del mantell de neu: pobre
freqüència: poques
Mida d'allau: petita

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades de manera aïllada sobretot als vessants obacs inclinats. En el transcurs de la jornada, són encara possibles purgues i allaus de neu humida de mida petita i, localment, mitjana.

Al mantell de neu hi ha capes febles aïllades. Els indrets perillosos es troben sobretot en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent. Les allaus poden penetrar fins a les capes profundes i, de manera aïllada, atenyen mida mitjana.

Amb l'augment de la temperatura diürna, són possibles de manera aïllada allaus de neu humida de mida petita i mitjana per sota dels 2600 m aproximadament. Això s'aplica principalment en vessants orientats a oest, sud i sud-est. Les allaus són com a mínim de mida petita.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.10: escenari de primavera

Amb el refredament i la baixa humitat de l'aire, durant la nit s'ha format una crosta superficial. La part central del mantell és en alguns casos feble, amb una crosta no portant a la superfície. Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades de manera aïllada.


En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran un debilitament del mantell de neu sobretot als vessants assolellats inclinats per sota dels 2600 m aproximadament.

Tendència

Amb el refredament, lleuger afebliment del perill d'allaus.



Grau de Perill 1 - Feble



Tendència: Perill d'allaus constant
en Dilluns 19 02 2024 →



Neu humida

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**freqüència: **poques**Mida d'allau: **petita**

En el transcurs de la jornada, són possibles purgues i allaus de neu humida de mida petita.

Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són possibles de manera aïllada purgues i allaus de neu humida de mida petita. Això es dona especialment en vessants assolellats inclinats. Les allaus són com a mínim només de mida petita.

Mantell de neu

En el transcurs de la jornada la radiació solar causarà en una àrea extensa un progressiu debilitament del mantell de neu. Acumulacions de neu ventada no són ja inestables.

En cotes baixes i mitges hi ha una mica de neu.

Tendència

Amb el refredament, lleuger afebliment del perill d'allaus.