



AM



PM



Grad de perilh 2 - Moderat


AM:



Tendéncia: perilh de lauegi constant →
 enDeluns 04 03 2024




Esguitlament
de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praupe**
 Frecuència: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Mejan**



Plaques de
vent




Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**
 Frecuència: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Mejan**


PM:



Tendéncia: perilh de lauegi constant →
 enDeluns 04 03 2024




Esguitlament
de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praupe**
 Frecuència: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Mejan**




Plaques de
vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**
 Frecuència: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**
 Frecuència: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Mejan**

Era hònt principau de perilh consistís en lauegi d'esguitlament basau. Problèma de nhèu ventada recenta en còtes nautes. Pendent era tarde seràn possibles lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion.

I a un perilh apreciable de lauegi d'esguitlament basau que non cau pas menspredar, especialment enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Aguestes pòden arténher mides perilhosament granes.

A conseqüència dera umitat der aire, pendent era tarde son possibles lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion, tanben de mida mejana. Açò se da pera subrecarga d'un unic montanhaire, sustot enes pales extrèmament arribentes per dejós des 2200 m aproximativament.



Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar, de manèra isolada, ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2600 m aproximativament. Açò se da principalement apròp des crestes. Es lauegi son en part de mida mejana. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

Es lauegi pòden, de manèra fòrça isolada, implicar era nhèu vielha. Endrets perilhosi se tròben sustot enes pales fòrça arribentes orientades a èst e oèst per dessus des 2600 m aproximativament. Endrets perilhosi se tròben tanben enes pales fòrça arribentes orientades a nòrd entre es 2100 e es 2300 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.10: scenari de primavera

Sustot ath sud enquia deluns queirà un shinhau de nhèu.

Eth heiredament nocturn a estat redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'atendirà ath long deth dia. Eth mantèth de nhèu ei fòrça umit per dejós des 2200 m aproximativament. Eth mantèth de nhèu ei umit per dejós des 2400 m aproximativament.


Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères. Açò se da per dessus des 2600 m aproximativament. De manèra fòrça isolada era nhèu recenta e era ventada arrepòsen ath dessus d'un mantèth feble de nhèu vielha.

Tendéncia



Era hònt principau de perilh consistís en lauegi d'esguitlament basau.




Grad de perilh 2 - Moderat

AM:**Tendéncia: perilh de lauegi constant** →

en Deluns 04 03 2024

Esguitlament
de nhèuEstabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**Frecuècia: **Quauqui**Mesura de lauet: **Mejan****PM:****Tendéncia: perilh de lauegi constant** →

en Deluns 04 03 2024

Esguitlament
de nhèuEstabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**Frecuècia: **Quauqui**Mesura de lauet: **Mejan**

Nhèu umida

Estabilitat deth celh de nhèu: **praubè**Frecuècia: **Quauqui**Mesura de lauet: **Mejan**

Era hònt principau de perilh consistís en lauegi d'esguitlament basau. Pendent era tarde seràn possibles lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion.

I a un perilh apreciable de lauegi d'esguitlament basau que non cau pas menspredar, especialment enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Agustes pòden arténher mides perilhosament granes.

A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, pendent era tarde son possibles lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion, tanben de mida mejana. Açò se da pera subrecarga d'un unic montanhaire, sustot enes pales extrèmament arribentes per dejós des 2200 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.10: scenari de primavera

Eth heiredament nocturn a estat en fòrça sectors fòrça bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'atrendirà ath long deth dia. Eth mantèth de nhèu ei fòrça umit per dejós des 2200 m aproximativament. Eth mantèth de nhèu ei umit per dejós des 2400 m aproximativament.



Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets. Açò se da en còtes nautes.

Tendéncia

Era hònt principau de perilh consistís en lauegi d'esguitlament basau.