



Grado de Peligro 2 - Limitado



Tendencia: peligro de aludes sin cambios →
 en Viernes 05 04 2024



Placas de viento



2400m

Estabilidad del manto de nieve: **pobre**
 Frecuencia: **algunas**
 Tamaño del alud: **mediano**



Deslizamientos



2600m

Estabilidad del manto de nieve: **muy pobre**
 Frecuencia: **pocas**
 Tamaño del alud: **grande**



Nieve húmeda



2800m

Estabilidad del manto de nieve: **muy pobre**
 Frecuencia: **pocas**
 Tamaño del alud: **mediano**

Nuevas acumulaciones de nieve venteada deben evaluarse con cautela en altitud. La nieve húmeda y los aludes de deslizamiento requieren atención.

Las placas de viento más recientes son en parte inestables sobre todo en orientaciones noroeste a este por el norte por encima de los 2400 m aproximadamente. Los aludes pueden en algunos casos ser desencadenadas incluso al paso de un solo montañero y alcanzar un tamaño mediano. El número y la dimensión de los lugares peligrosos aumentarán con la altitud. Los aludes pueden implicar la nieve antigua muy húmeda.

En las laderas herbosas inclinadas, son posibles avalanchas de deslizamiento basal de tamaño mediano a grande. Esto se da principalmente en las laderas solanas inclinadas por debajo de los 2600 m aproximadamente incluyendo en las laderas umbrías inclinadas por debajo de los 2400 m aproximadamente. Evitar las zonas con grietas de deslizamiento basal.

Con el aumento de la temperatura diurna y la radiación solar, la probabilidad de desencadenamiento de aludes de nieve húmeda o muy húmeda aumentará progresivamente, sobre todo en las laderas solanas inclinadas por debajo de los 2800 m aproximadamente, y en las laderas umbrías inclinadas por debajo de los 2400 m aproximadamente.

Manto nivoso

Patrones de peligro

pp.6: frío, nieve suelta y viento

pp.2: deslizamientos

Las nuevas y las menos recientes acumulaciones de nieve venteada descansan encima de capas blandas sobre todo en orientaciones noroeste a este por el norte en altitud. La unión entre las diversas placas de viento es localmente aún desfavorable.




El enfriamiento nocturno será reducido. La superficie del manto de nieve se volverá a helar apenas y se ablandará ya durante la mañana. Esto se da especialmente en las laderas solanas en cotas medias y altas, y en las laderas umbrías por debajo de los 2400 m aproximadamente.

Tendencia

El peligro de aludes de nieve muy húmeda y de deslizamiento basal aumentará.
Con la subida de temperaturas, las placas de viento se estabilizarán.



Grado de Peligro 2 - Limitado



Tendencia: peligro de aludes sin cambios →
en Viernes 05 04 2024



Deslizamientos



Estabilidad del manto de nieve: **muy pobre**

Frecuencia: **pocas**

Tamaño del alud: **mediano**

Nieve húmeda y deslizamientos en cotas altas.

En las laderas herbosas inclinadas, son posibles avalanchas de deslizamiento basal de tamaño pequeño a mediano. Evitar las zonas con grietas de deslizamiento basal.

Con el aumento de la temperatura diurna y la radiación solar, la probabilidad de desencadenamiento de aludes de nieve muy húmeda aumentará progresivamente, sobre todo en las laderas solanas inclinadas en cotas altas, y en las laderas umbrías inclinadas por debajo de los 2400 m aproximadamente.

Manto nivoso

Patrones de peligro

pp.2: deslizamientos

pp.10: escenario de primavera

El enfriamiento nocturno será en algunos casos bastante bueno. La superficie del manto de nieve se volverá a helar apenas y se ablandará durante el día. Esto se da especialmente en las laderas solanas en cotas medias y altas, y en las laderas umbrías por debajo de los 2200 m aproximadamente.

Tendencia

La nieve húmeda y los aludes de deslizamiento requieren atención.