




Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi
enDimars 09 04 2024



Nhèu umida

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praupe**Frecuència: **Molti**Mesura de lauet: **Mejan**Esguitlament
de nhèuEstabilitat deth celh de nhèu: **praupe**Frecuència: **Quauqui**Mesura de lauet: **Gran**

2600m

Era hònt principau de perilh consistís en lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau. Era nhèu umida e es lauegi d'esguitlament requerissen atencion.

Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi d'esguitlament basau e de purges fòrça umides aumentarà rapidament en totes es orientacions. En canaus inclinades es lauegi fòrça umits arribaràn de manèra isolada enquia còtes mejanès.

Enes pales erbosees arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e grana. Açò se da enes pales soleienques arribentes en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.2: esguitlament de nhèu


Eth heiredament nocturn a estat redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu non s'a regelat pas e ja s'atrendirà ath maitin. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn un extrem amarament deth mantèth de nhèu. Açò se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères encara en còtes mejanes e nautes.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau diminuirà progressivament sonque pendent era net.



Grad de perilh 3 - Mercat




Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi
enDimars 09 04 2024



Nhèu umida



Limit deth bòsc



Esguitlament
de nhèu



Limit deth bòsc



2000m

Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan

Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Mejan

Era hònt principau de perilh consistís en lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida.

Enes pales erbosees arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida mejana. Damb er aument dera temperatura diürna e era radiacion solar, era probabilitat de desencadenament de lauegi d'esguitlament basau e de purgues fòrça umides augmentarà rapidament en totes es orientacions, non sonque enes pales soleienques includint enes pales ombrères arribentes en còtes mejanes e nautes. En canaus inclinades es lauegi fòrça umits arribaràn de manera isolada enquia còtes mejanes. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà molt pòc e ja s'atrendirà ath maitin. Aço se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères encara en còtes mejanes e nautes.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau diminuirà progressivament sonque pendent era net.