


Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimenge 21 04 2024



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)
Frecuència: [Pògui](#)
Mesura de lauet: [Mejan](#)

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar, de manèra isolada, ath pas d'un unic montanhaire sustot en orientacions nòrd-oèst enquiath sud-èst peth nòrd per dessus des 2200 m aproximativament. Agustei endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions en nauta montanha. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp des crestes e tanben en canaus e conques. Es lauegi pòden arténher mides mejanes de manèra isolada, principalement enes sectors mès afectadi pes precipitacions.

Damb era nhèu recenta, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense coesion aumens de mida petita, sustot enes sectors mès afectadi pes precipitacions.

(-) son possibles sonque de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau de mida mejana. Açò se da enes pales erbozes arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu


En quauqui sectors an queigit de 10 a 20 cm de nhèu, locaument mès. Sustot ath nòrd-oèst queirà enquia 15 cm de nhèu, locaument enquia 25 cm. Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt, en quauqui casi se formaràn plaques de vent inestables. Agustes repòsen ath dessus de coches trendes en altitud.

Era nhèu vielha ei umida, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion qu'arrepòse sus ua crosta de regèu portanta. Açò se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombères per dejós des 2600 m aproximativament.

Tendència

Es condicions deth temps afavoriràn ua estabilizacion des plaques de vent. Non son possibles lauegi d'esguitlament basau.

Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimenge 21 04 2024

Las condiciones son favorables en cuanto al peligro de avalanchas.

Es plaques de vent mès recentes son, de manèra isolada, encara inestables, sustot apròp des crestes en altitud. Es petiti lauegi pòden arrossegar e hèr a quèir un practicant d'espòrts d'iuèrn.

(-) son possibles sonque de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau. Açò se da especiaument enes pales erbooses arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

A causa dera crosta dura i a eth perih d'esguitlar e quèir enes pales arribentes.

Celh de nhèu

Locaument queirà un shinhau de nhèu. Era nhèu vielha ei umida, damb ua crosta de regèu portanta en superfícia. Açò se da enes pales soleienques en totes es côtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament.

Sustot per dejós deth limit deth bòsc peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendència

Se manten perih feble (1) de lauegi. Ath sud queirà un shinhau de nhèu.