




Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: Diminucion deth perilh de lauegi
enDeluns 22 04 2024



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Molti**
Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu recenta



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Molti**
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problema de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion. (-) son probables nombrosi lauegi de nhèu sense coesion.

Es plaques de vent mès recents se pòden desencadenar ja ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions per dessús des 2200 m aproximativament. Aguestes an demorat en part nheuades e, per aquerò, de mau identificar. Endrets perilhosí se tròben sustot apròp des crestes e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Es endrets perilhosí e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud. Es lauegi pòden arténher mides mejanes.

(-) son probables nombrosi lauegi de nhèu sense coesion de mida petita e mejana, sustot en cas de lucades mès importantes.

Ath delà son possibles de manèra fòrça isolada lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e grana. Açò se da enes pales erbosees arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

An queigut de 30 a 50 cm de nhèu, locaument mès. Enquia deluns queiràn de 20 a 40 cm de nhèu. Eth vent a estat en quauqui casi fòrt.

Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes per dessús des 2200 m aproximativament.

Era nhèu vielha ei umida, damb ua crosta de regèu establa en superfícia. Açò se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament.

Tendència



Es condicions de temps causaràn ua progressiu consolidacion deth mantèth de nhèu.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi
enDeluns 22 04 2024



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu recenta



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Molti**
Mesura de lauet: **Petit**

Eth problema de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion. (-) son probables nombrosi lauegi de nhèu sense coesion.

Es plaques de vent mès recents se pòden desencadenar, en quauqui casi, ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions per dessús des 2200 m aproximativament. Aguestes an demorat en part nheuades e, per aquerò, de mau identificar. Endrets perilhosí se tròben sustot apròp des crestes e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Ena cresta principau des Aups e en zònes aupines, es endrets perilhosí son mès freqüenti e eth perilh ei leugèrament mès gran. Es lauegi pòden arténher mides mejanes.

(-) son probables nombrosi lauegi de nhèu sense coesion de mida petita a mejana, sustot en cas de lucades mès importantes.

Ath delà son possibles de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau de mida mejana. Aço se da enes pales erbosees arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

An queigut de 10 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Enquia deluns queiràn de 10 a 30 cm de nhèu. Eth vent a estat en quauqui casi fòrt.

Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes per dessús des 2200 m aproximativament.

Era nhèu vielha ei umida, damb ua crosta de regèu establa en superfícia. Aço se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament.

Tendéncia



Es condicions de temps causaràn ua progressiu consolidacion deth mantèth de nhèu.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant
enDeluns 22 04 2024 →



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problema de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es plaques de vent recentes e antigues se pòden desencadenar, de manèra isolada, ath pas d'un unic montanhaire sustot en orientacions nòrd-oèst enquiat sud-oèst peth nòrd per dessús des 2200 m aproximativament. En zònes aupines, es endrets perilhosí son presenti en totes es orientacions e eth perilh ei leugèrament mès gran. Es endrets perilhosí se tròben sustot apròp des crestes e tanben en canaus e conques. Es lauegi pòden arténher mides mejanas de manèra isolada, principaument enes sectors mès afectadi pes precipitacions.

(-) son probables de manèra isolada lauegi de nhèu sense coesion aumens de mida petita, sustot enes sectors mès afectadi pes precipitacions.

(-) son possibles sonque de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau de mida mejana. Açò se da enes pales erbosees arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Ath nòrd an queigut de 10 a 20 cm de nhèu, locaument mès. Eth vent a estat fòrt. Sustot ath sud a compdar dera tarde queirà enquia 15 cm de nhèu. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes repòsen ath dessús de coches trendes en altitud.

Era nhèu vielha ei umida, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion qu'arrrepòse sus ua crosta de regèu portanta. Açò se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament.

Tendència

Ath sud queirà enquia 15 cm de nhèu. Eth problema de nhèu ventada recenta requerís atencion. Non son possibles lauegi d'esguitlament basau.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant

enDeluns 22 04 2024



Las condicions son favorables en cuanto al peligro de avalanchas.

Es naues acumulacions de nhèu ventada son principaument petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada, sustot apròp des crestes en altitud. Atencion ath perilh d'èster arrossegadi per un laueg ath dessús des malhs.

(-) son possibles sonque de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau. Açò se da especiaument enes pales erbosees arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

A causa dera crosta dura i a eth perilh d'esguitlar e quèir enes pales arribentes.

Celh de nhèu

En quauqui sectors queirà un shinhau de nhèu. Era nhèu vielha ei umida, damb ua crosta de regèu portanta en superfícia. Açò se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament.

Sustot per dejós deth limit deth bòsc peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendéncia

Se mantén perilh feble (1) de lauegi.