




AM




PM



Grau de Perill 3 - Marcat

AM



Tendència: Perill d'allaus constant →
en dissabte, 6 d'Abriu de 2024



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **petita**



Placa de vent



2300m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **petita**

PM



Tendència: Perill d'allaus constant →
en dissabte, 6 d'Abriu de 2024



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Placa de vent



2300m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **petita**

Eth problèma de nhèu umida ei era hònt principau de perilh. Nhèu ventada en còtes nautes.

Damb er augment dera temperatura, ath long dera jornada eth perilh de lauegi de nhèu umida aumentarà progressivament ath grad 3 (mercat). Es lauegi umits son a viatges de mida mejana. Es acumulacions de nhèu ventada vielhes pòden en quauqui casi encara èster desencadenades accidentament sustot en pales ombrères extrèmes e pòc freqüentades e en altitud, especiaument enes sòns marges. Aguestes son a viatges de mida mejana. Ath delà ath long dera jornada sustot enes pales orientadi a nòrd e nord-èst e en altitud se formaràn plaques de vent addicionaus. En particular en limit damb Benasc e en limit damb era Ribagòrça e eth Palhars, es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perilh ei mès gran. Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau.

Era actuau situacion de lauegi requerís ua eleccion atentiu der itinerari. Es excursions de montanha e es baishades dehòra de pista an de finalizar tà meddia.

Mantell de neu

Es condicions de lauegi demoren primaueraus. Es acumulacions de nhèu ventada dures s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha. Eth heiredament nocturn serà redusit. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn en totes es orientacions en un airau extens ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. Eth vent damb bohades fòrtes transportarà era nhèu.

Per dessús des 2000 m aproximativament son presenti de 40 a 120 cm de nhèu, locaument encara mès. En còtes nautes e nauta montanha es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

Tendència

Enquia que non baishen es temperatures, escàs afebliment deth perilh de lauegi de nhèu umida e fòrça umida.