






Buletin nivometeorologic pentru perioada 27.03.2025 ora 20 - 31.03.2025 ora 20



**CARPAȚII MERIDIONALI: masivele BUCEGI, FĂGĂRAȘ,,
PARÂNG, ȚARCU-GODEANU**

RISC 2- MODERAT



La peste 1800 m se va depune un strat nou de zăpadă, local însemnat, ce va depăși 30..40 cm mai ales pe versanții sudici ai Carpaților Meridionali, la peste 2000 m. Acest strat va putea aluneca peste stratul vechi existent, mai ales pe pantele înclinate cu acumulări mai consistente, ducând la declanșarea de avalanșe mici sau medii, riscul fiind amplificat la supraîncărcări. În cazuri izolate, avalanșele pornite de la altitudini înalte pot coborî sub altitudinea de 1800 m - risc **moderat (2)**

La altitudini mai mici de 1800 m stratul de zăpadă este în mare parte topit, exceptând pantele sau văile umbrite, unde mai întâlnim zăpadă veche. Precipitațiile sub formă de ploaie vor favoriza în continuare diminuarea stratului de zăpadă rămas.




Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.



Buletin nivometeorologic pentru perioada 27.03.2025 ora 20 - 31.03.2025 ora 20

CARPAȚII ORIENTALI: RODNEI, CĂLIMANI-BISTRIȚEI, CEAHLĂU

RISC 1 - REDUS



La peste 1800 m stratul de zăpadă s-a redus semnificativ și este în mare parte discontinuu și umezit, fiind depus peste zăpada mai veche și compactată. Precipitațiile mixte care vor urma, vor depune un strat nou de zăpadă la peste 2000 m, strat izolat mai consistent. Acest strat poate aluneca peste cel vechi, favorizând unele curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni. Riscul este **redus (1)**.

La altitudini mai mici de 1800 m stratul de zăpadă este în mare parte topit, exceptând pantele sau văile umbrite, unde mai întâlnim zăpadă veche. Precipitațiile sub formă de ploaie vor favoriza în continuare diminuarea stratului de zăpadă rămas.

CARPAȚII OCCIDENTALI: MUNȚII VLĂDEASA - MUNTELE MARE



Stratul de zăpadă este în mare parte topit, exceptând unele văi sau pante umbrite, unde mai întâlnim zăpadă veche. Precipitațiile predominant sub formă de ploaie vor reduce în continuare zăpada rămasă. Doar izolat, la peste 1800 m, precipitațiile vor fi mixte și se poate depune un strat de zăpadă proaspătă și umedă.

Buletin nivometeorologic pentru perioada 27.03.2025 ora 20 - 31.03.2025 ora 20

EVOLUȚIA VREMII DIN ULTIMELE ZILE

Vremea a fost în general închisă și ușor mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros. Pe arii relativ extinse s-au semnalat ploi, ce au avut mai ales caracter de aversă, iar în zonele înalte ale Carpaților Meridionali s-au semnalat precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Pe arii restrânse cantitățile de apă au depășit 10-15 l/mp. Vântul a avut rafale în general de 50-60 km/h, iar pe crestele Carpaților Meridionali a depășit izolat 80 km/h. Local s-a semnalat ceață.

Stratul de zăpadă a scăzut în toate masivele, cu până la 12...14 cm și este discontinuu la altitudini mai mici de 1800 m.

În data de 27.03.2025, la ora 14, stratul de zăpadă din platforma stațiilor meteorologice măsura:

Carpații Meridionali: 71 cm la Vf. Omu, 32 cm la Bâlea-Lac, 10 cm la Vf. Țarcu

Carpații Orientali: 57 cm la Vf. Călimani, 50 cm la Ceahlău-Toaca, 34 cm la Vf. Lăcăuți, 8 cm la lezer

Carpații Occidentali: petice la Vf. Vlădeasa

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 27.03.2025 ora 20 - 31.03.2025 ora 20

Vremea va fi în general închisă și mai caldă decât cea normală pentru această perioadă în primele două zile, apoi temperaturile vor scădea ușor și vor avea valori apropiate de normal. Cerul va fi mai mult noros și pe arii relativ extinse se vor semnala ploi, mai ales cu caracter de aversă. Prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 50...70 l/mp în Carpații Meridionali; cele mai însemnate cantități vor cădea în cursul zilei de 28 martie și mai ales al nopții de 28/29 martie. La altitudini de peste 2000 m, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat consistent de zăpadă, îndeosebi în Carpații Meridionali. Vor fi perioade în care vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar în vestul Carpaților Meridionali, la altitudini în general de peste 2000 m, rafalele vor fi de 75...90 km/h și va fi viscol. Trecător se va semnala ceață.

Temperaturi prognozate în intervalul 27.03.2025 ora 20 - 31.03.2025 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în general -5...0 grade

temperaturi maxime: în general -2...4 grade

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în general -2...4 grade

temperaturi maxime: în general 4...10 grade

Vânt la peste 2000 m: intensificări temporare de 70-90 km/h din sector nord-estic până în 30 martie, apoi sud-vestic

Izoterma de 0 grade: coboară de la 2600-2800 m spre 2400-2600 m în prima zi, apoi treptat spre 400-600 m în ultima zi

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc