




Buletin nivometeorologic pentru perioada 07.04.2025 ora 21 - 10.04.2025 ora 21



CARPAȚII ORIENTALI: CĂLIMANI

RISC 3 - ÎNSEMNAȚ



La peste 1800 m s-a depus un strat consistent, de peste 25-30 cm, de zăpadă pulver, peste stratul vechi care a înghețat. Datorită vântului puternic, s-au format și depozite însemnate, care depășesc 60...80 cm. Ninsorile ulterioare vor mai depune un strat nou de pulver, mai redus, dar care, împreună cu cel deja existent, va putea aluneca cu ușurință peste stratul înghețat, favorizând declanșarea avalanșelor de dimensiuni medii și izolat mai mari, îndeosebi pe pantele înclinate cu acumulări consistente, riscul fiind amplificat chiar și la supraîncărcări mici - **risc însemnat (3)**.

La altitudini mai mici de 1800 m stratul de zăpadă depus în ultimele zile este mai redus, sub acesta fiind stratul mai vechi, care a înghețat. Ninsorile care vor urma vor mai depune un strat relativ scăzut de zăpadă, care, împreună cu cel deja depus, poate aluneca peste stratul aflat dedesubt, ducând la declanșarea unor avalanșe mici și izolat medii, riscul fiind amplificat la supraîncărcări - risc **moderat (2)**





Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.



Buletin nivometeorologic pentru perioada 07.04.2025 ora 21 - 10.04.2025 ora 21

CARPAȚII MERIDIONALI: BUCEGI, FĂGĂRAȘ
CARPAȚII ORIENTALI: RODNEI, CEAHLĂU

RISC 2- MODERAT






La peste 1800 m, s-a depus un strat nou de pulver, de 10...15 cm, peste cel vechi care a înghețat odată cu scăderea bruscă și accentuată a temperaturilor. Pe văi și în zonele adăpostite sunt depozite mai însemnate. Ninsorile ulterioare vor depune un nou strat de pulver, redus, care, împreună cu cel deja existent, va putea aluneca cu ușurință peste stratul înghețat, favorizând declanșarea avalanșelor de dimensiuni mici sau medii, mai ales pe pantele înclinate cu acumulări mai consistente, riscul fiind amplificat la supraîncărcări - risc **moderat (2)**.

La altitudini mai mici de 1800 m s-a depus un strat redus de zăpadă, peste cel vechi care a înghețat, iar în zilele care vor urma se va depune un nou strat, de asemenea redus, de zăpadă, care împreună pot aluneca peste stratul înghețat aflat dedesubt, îndeosebi pe pantele înclinate, ducând la declanșarea unor avalanșe în general mici, riscul fiind amplificat la supraîncărcări - **redus (1)**.

CARPAȚII MERIDIONALI: PARÂNG, ȚARCU-GODEANU
CARPAȚII OCCIDENTALI: MUNȚII VLĂDEASA - MUNTELE MARE

RISC 1 - REDUS



La peste 1800 m s-a depus un strat de 10...15 cm de zăpadă, peste stratul vechi, redus, care a înghețat odată cu scăderea accentuată și bruscă a temperaturilor. Ninsorile care vor urma, vor mai depune un strat mic de zăpadă de tip pulver, care, împreună cu cel deja depus, poate aluneca peste cel vechi, înghețat, favorizând unele curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni. Riscul va fi **redus (1)**.

La altitudini mai mici de 1800 m stratul de zăpadă este discontinuu, exceptând unele văi umbrite, unde mai este un strat redus de zăpadă veche, acum înghețată. Stratul redus de zăpadă proaspătă care se va depune poate aluneca peste cel vechi sau peste solul înghețat, îndeosebi pe pantele înclinate, ducând la declanșarea unor avalanșe de mici dimensiuni - riscul va fi **redus (1)**.

Buletin nivometeorologic pentru perioada 07.04.2025 ora 21 - 10.04.2025 ora 21

EVOLUȚIA VREMII DIN ULTIMELE ZILE

Vremea s-a răcit semnificativ, devenind deosebit de rece pentru prima decadă a lunii aprilie. A nins viscolit în întreaga arie montană, iar izolat precipitațiile au fost mai însemnate cantitativ (15...25 l/mp). Vântul a avut temporar intensificări la altitudini mai mari de 1700 m, îndeosebi în Carpații Meridionali și Orientali, au fost rafale de 80...100 km/h. Local s-a semnalat ceață, asociată pe creste și cu depunere de chiciură. Stratul de zăpadă a crescut în zonele înalte din Călimani cu peste 20 cm și este discontinuu la altitudini mai mici de 1500 m.

În data de 07.04.2025, la ora 15, stratul de zăpadă din platforma stațiilor meteorologice măsura:

Carpații Meridionali: 89 cm la Vf. Omu, 55 cm la Bâlea-Lac, 10 cm Țarcu, 3 cm Fundata, 3 cm Predeal, 2 cm Sinaia, 1 cm Cuntu

Carpații Orientali: 114 cm la Vf. Călimani, 83 cm la Ceahlău-Toaca, 43 cm la Vf. Lăcăuți, 40 cm la Iezer, 17 cm Bucin, 6 cm Poiana Stampei, 3 cm Penteleu

Carpații Occidentali: 9 cm Vf. Vlădeasa, 7 cm Băișoara, 1 cm Stâna de Vale

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 07.04.2025 ora 21 - 10.04.2025 ora 21

Vremea va fi deosebit de rece, geroasă la altitudini de peste 1800 m. Cerul va avea înnorări temporare și va ninge în general slab în întreaga arie montană, stratul de zăpadă nou-depus putând atinge 5...15 cm. Vântul va prezenta intensificări temporare în primele două zile și susținute în cea de a treia, cu viteze de 80...90 km/h și 100...120 km/h la altitudini mari, viscolind ninsoarea. Se va semnală ceață, asociată și cu depunere de chiciură.

Temperaturi prognozate în intervalul 07.04.2025 ora 21 - 10.04.2025 ora 21:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: -18...-12 grade în primele două nopți, apoi în ușoară creștere, -14...-9 grade

temperaturi maxime: -12 ...-7 grade

Sub 1800 m:

temperaturi minime: -13...-9 grade în prima noapte, apoi în ușoară creștere, -11...-4 grade

temperaturi maxime: -7...0 grade

Vânt la peste 2000 m: intensificări temporare de 60-80 km/h în primele două zile, apoi de 100-120 km/h din sector nord-vestic

Izoterma de 0 grade: urcă de la circa 150-300 m la 500-800 m

meteorolog: Narcisa Milian

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc