





Buletin nivometeorologic pentru perioada: 05.01.2026 ora 20 - 07.01.2026 ora 20



MUNȚII FĂGĂRAȘ ȘI BUCEGI

RISC 4 - MARE



La peste 1800 m: În partea superioară a zăpezii întâlnim un strat consistent de zăpadă proaspătă, depusă în ultimele zile în grosimi de 20-40 cm peste un strat mai vechi, incomplet stabilizat, iar în următoarele zile se vor semnala ninsori care vor crește local stratul cu 10-20 cm și izolat mai mult. Vântul puternic din ultimele zile a depus zăpada ușoară în zonele adăpostite în depozite consistente, iar în special în apropierea creștelor s-au format numeroase plăci de vânt. În profunzime se întâlnește un strat de cristale tip cupă, cu care straturile de zăpadă de deasupra au aderență scăzută și peste care pot aluneca cu ușurință. Deasupra solului regăsim un strat întărit. Astfel, în partea superioară a zăpezii vom întâlni un strat cu rezistență scăzută și cu aderență slabă la stratul inferior, ce va depăși pe alocuri 40-60 cm și care se va umezi ușor și îngreuna pe fondul creșterii de temperatură.



Pe pantele înclinate, va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și mari, care să angreneze zăpada recentă sau plăcile de vânt formate în zona creștelor, atât spontan, cât mai ales la suprasarcini - risc **mare(4)**.

Sub 1800 m: stratul de zăpada are dimensiuni importante, local de peste 30-40 cm. Pe fondul creșterii temperaturii și temporar al precipitațiilor lichide, se vor semnala curgeri sau avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari, în special la altitudini de 1500-1800 m - risc **însemnat(3)**.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 05.01.2026 ora 20 - 07.01.2026 ora 20

MUNȚII ȚARCU-GODEANU;

RISC 4 - MARE







La peste 1800 m: Ninsorile recente au adăugat un strat de 25...45 cm de zăpadă proaspătă, crescând astfel grosimea stratului superior cu rezistență scăzută și aderență slabă la stratul inferior. Datorită vântului puternic din ultimele zile, zăpada proaspătă, ușoară, s-a depus în zonele adăpostite în depozite consistente, iar în special în apropierea creștelor s-au format numeroase plăci de vânt, unele de grosimi considerabile. Sub acest strat se regăsește un strat de cristale tip cupă, în special pe versanții nordici, cu care stratul superior are aderență scăzută și peste care poate aluneca cu ușurință. Deasupra solului este un strat întărit.

Pe pantele înclinate, va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și mari, care să angreneze zăpada recent acumulată sau plăcile de vânt formate în zona creștelor, atât spontan, sub influența creșterii de temperatură, cât mai ales la suprasarcini - risc **mare(4)**.

Sub 1800 m: zăpada are dimensiuni importante, local de peste 25-35 cm. Vor fi posibile unele curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și medii la altitudini de 1500-1800 m - risc **însemnat(3)**.

CARPAȚII ORIENTALI

RISC 3 - ÎNSEMNAȚ



La peste 1800 m: Stratul de zăpadă a crescut semnificativ în ultimele zile, local cu 20...25 cm și izolat chiar mai mult. Depozite mai consistente se întâlnesc pe văile adăpostite, unde a fost adusă de vânt. În zonele înalte s-au format noi plăci de vânt. Pe pantele înclinate, va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari, care să angreneze plăcile de vânt formate în zona creștelor și stratul recent depus, mai ales la suprasarcini. Creșterea temperaturii va facilita posibilitatea apariției unor curgeri spontane, pe pantele mai înclinate. Riscul este **însemnat(3)**.

Sub 1800 m: stratul de zăpadă a crescut, local cu peste 10-20 cm. Pe anumite văi se întâlnește zăpadă în depozite mai consistente, parțial adusă de vânt din altitudine. Vor fi condiții pentru unele curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii pe pantele mai înclinate, prin alunecarea zăpezii mai ușoare din partea superioară,, riscul fiind amplificat la supraîncărcări - risc **moderat(2)**.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 05.01.2026 ora 20 - 07.01.2026 ora 20



METEO



ROMANIA

MUNȚII PARÂNG-ȘUREANU

RISC 3 - ÎNSEMNAT




La peste 1800 m: Se vor semnala ninsori însemnate cantitativ, care vor depune local 20 cm și izolat mai mult. Vântul puternic din ultimele zile a determinat în perioada precedentă apariția unor plăci de vânt mai ales în apropierea creștelor, depuse pe unii versanți nordici peste cristale tip cupă, cu care au aderență scăzută și peste care pot aluneca cu ușurință, iar în zonele adăpostite sunt formate depozite mai mari. Deasupra solului se întâlnește un strat întărit. Pe pantele înclinate, va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari, care să angreneze zăpada care se va depune sau plăcile de vânt formate în zona creștelor, mai ales la suprasarcini. Riscul va fi **însemnat(3)**.

Sub 1800 m: stratul de zăpadă a crescut semnificativ și sub 1800 m, în special pe versanți sudici. Sub influența temperaturilor ușor pozitive și a precipitațiilor lichide, se vor semnala unele curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și medii la altitudini de 1500-1800 m - risc **însemnat (3)**

CARPAȚII OCCIDENTALI

RISC 3 - ÎNSEMNAT



Stratul de zăpadă a crescut semnificativ, local cu peste 30-40 cm și va crește în continuare în zonele înalte, pe alocuri cu 10...20 cm în apropierea creștelor. Creșterea temperaturii va duce la umezirea stratului și la apariția unor curgeri spontane, care să angreneze stratul cu rezistență scăzută de la suprafață. Zăpada recent acumulată este depusă peste cruste de gheață sau peste zăpada mai veche, stabilizată spre bază. Depozite mai consistente de zăpadă se întâlnesc pe văile adăpostite, unde a fost adusă de vânt. În apropierea creștelor întâlnim plăci de vânt. Pe pantele înclinate va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și medii, care să angreneze plăcile de vânt formate în zonele înalte, mai ales la suprasarcini. Riscul de avalanșă va fi **însemnat (3)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 05.01.2026 ora 20 - 07.01.2026 ora 20

EVOLUȚIA VREMII DIN ULTIMELE 3 zile

Vremea a fost în general închisă și apropiată de normalul termic al perioadei, cu temperaturi în creștere ușoară astăzi. Cerul a fost mai mult noros. Pe arii extinse s-au semnalat ninsori consistente, care au cumulat 15-20 l/mp în toate grupele montane și care au depășit local 30-40 l/mp în masivele vestice și sud-vestice. Vântul a avut viteze de 50-70 km/h în majoritatea masivelor, temporar la rafală cu 70...90 km/h la altitudini mari, viscolind ninsoarea și formând depozite însemnate pe anumite zone și izolat cu rafale ce au depășit 100...120 km/h pe crestele masivelor vestice. Temporar s-a semnalat ceață, asociată și cu depunere de chiciură pe creste. Stratul de zăpadă a avut creșteri de de 10..25 cm în Carpații Orientali, 20..30 cm în Carpații Meridionali și de până la 30..40 cm în Carpații Occidentali.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsură, în data de 05.01.2026, ora 14:

Carpații Meridionali: 154 cm la Vârful Omu, 88 cm la Bâlea-Lac, 39 cm la Țarcu, 47 cm la Sinaia, 28 cm la Păltiniș, 18 cm la Parâng, 26 cm la Predeal, 38 cm la Fundata, 36 cm la Cuntu și 14 cm la Voineasa
Carpații Orientali: 47 cm la Călimani, 47 cm la Lăcăuți, 47 cm la Bucin, 22 cm la Penteleu, 25 cm la Iezer-Rodnei, 23 cm la Ceahlău, 17 cm la Poiana Stampei
Carpații Occidentali: 56 cm la Băișoara, 48 cm la Stâna de Vale, 46 cm la Semenici, 45 cm la Roșia Montană, 12 cm la Vlădeasa 1800

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 05.01.2026 ora 20 - 07.01.2026 ora 20

Vremea va fi în general închisă, cu temperaturi în creștere față de intervalul precedent, în ușoară scădere în 07 ianuarie în masivele nord-vestice. Cerul va fi mai mult noros și în întreaga arie montană se vor semnală predominant ninsori, temporar ploi sau lapovițe sub 1500 m, iar în cursul zilei de 06 ianuarie trecător și la altitudini de 1500-1700 m. Cantitățile de precipitații vor depăși local 20...25 l/mp în Carpații Occidentali, nordul celor Orientali și în cei Meridionali și pe alocuri 10-15 l/mp în grupele centrale și nordice ale Carpaților Orientali. Cumulat se pot depăși 30-40 l/mp în masivele vestice și sud-vestice, pe areale restrânse. Vântul va prezenta intensificări temporare de 40-50 km/h în toate masivele și temporar de 50-70 km/h în zonele înalte, viscolind trecător ninsoarea în zona creștelor Meridionalilor, cu rafale ce vor atinge 80 km/h pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură. Local se va forma ceață.

Temperaturi prognozate în intervalul 05.01.2026 ora 20 - 07.01.2026 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în general între -6...-2 grade

temperaturi maxime: în general între -3...1 grad

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în general între -3...0 grade

temperaturi maxime: în general între -1...4 grade

mtg. Udo Reckerth

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc