






Buletin nivometeorologic pentru perioada: 16.01.2026 ora 20 - 19.01.2026 ora 20



MUNȚII FĂGĂRAȘ

RISC 4 - MARE



La peste 1800 m: În ultimele 36 de ore s-au depus local 10..20 cm de zăpadă în zonele înalte, mai ales pe versanții nordici. Temperaturile relativ ridicate din ultimele zile au determinat însă umezirea și îngreunarea zăpezii, în special sub 2000 m. În zona creștelor se mențin plăcile mai vechi de vânt, pe versanți cu orientări diferite. În zona creștelor întâlnim zone de 20..40 cm de pulver, iar în profunzime straturi subiacente cu rezistență încă scăzută. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, local de peste 2 metri. Spre sol se regăsesc cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate alunecarea straturilor superioare și genera unele avalanșe de dimensiuni mari. Pe pantele înclinate se va menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari, care să angreneze stratul nou-depus și cel compactat din partea superioară, precum și plăcile de vânt formate în zonele înalte, mai ales la suprasarcini, dar izolat și spontan - risc **mare(4)**.

Sub 1800 m: Stratul de zăpadă are și aici dimensiuni destul de mari, local de 30..60 cm, iar pe versanții nordici s-au depus pe alocuri peste 10 cm de zăpadă proaspătă, în special la peste 1600 m. Temperaturile diurne apropiate de 0 grade din primele 24 de ore vor menține umed și greu stratul superior, care poate astfel aluneca peste cel vechi și întărit, ducând la declanșarea de curgeri sau avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari, în special la altitudini de 1600-1800 m, dar răcirea treptată a vremii va induce o consolidare în strat - risc **însemnat(3)**.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 16.01.2026 ora 20 - 19.01.2026 ora 20





METEO



ROMANIA

CARPAȚII MERIDIONALI: MUNȚII BUCEGI, PARÂNG-ȘUREANU, ȚARCU-GODEANU

RISC 3- ÎNSEMNAȚ







La peste 1800 m: La peste 2000 m se întâlnește un strat de pulver, de grosimi ce depășesc pe alocuri 10 cm. Tasarea zăpezii din partea superioară a continuat, în special sub 2000 m, formându-se astfel un strat mai compactat la suprafață. În zona creștelor sunt formate numeroase plăci de vânt, pe versanți cu orientări diferite. Primii 40..60 cm de la suprafață sunt constituiți din zăpadă neconsolidată. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, depășind izolat 2 metri. Spre sol se regăsesc cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate alunecarea straturilor superioare și genera unele avalanșe de dimensiuni mari. Pe pantele înclinate se va menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari, care să angreneze stratul nou-depus și cel compactat din partea superioară, precum și plăcile de vânt formate în zonele înalte, mai ales la suprasarcini, iar cu totul izolat și spontan - risc **însemnat(3)**.

Sub 1800 m: Stratul de zăpadă este consistent și sub 1800 m, atingând pe alocuri 30..60 cm și izolat mai mult pe anumite văi apropiate de 1800 m. Temperaturile diurne apropiate de zero grade din primele 24 de ore, vor menține zăpadă umedă și grea, astfel încât stratul superior poate aluneca peste cel vechi și întărit, ducând la declanșarea de curgeri sau avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari, în special la altitudini de 1600-1800 m, dar răcirea treptată a vremii va induce o consolidare în strat - risc **însemnat(3)**.

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVELE RODNEI, CĂLIMANI-BISTRITEL

RISC 3- ÎNSEMNAȚ



La peste 1800 m: În partea superioară a zăpezii întâlnim un strat care continuă să prezinte rezistență relativ scăzută în primii 20...40 cm, deși s-a mai compactat în ultimul interval pe fondul temperaturilor mai crescute. Scăderea temperaturii va ajuta la consolidarea stratului. Depozite mai consistente se întâlnesc pe văile adăpostite, iar în zonele înalte sunt numeroase plăci de vânt. Pe pantele înclinate se va menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici sau medii, mai ales în masivele nordice, care să angreneze plăcile de vânt prezente în zona creștelor și stratul cu rezistență redusă din partea superioară, mai ales la suprasarcini. Riscul va fi **însemnat(3)**.


Sub 1800 m: stratul de zăpadă este mai consistent la altitudini de peste 1500 m și pe versanții vestici, iar pe unele văi umbrite se întâlnesc depozite mai însemnate. Stratul este ușor umezit, iar răcirea vremii va ajuta la consolidarea treptată a zăpezii. Se mențin condițiile pentru unele curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii pe pantele mai înclinate, prin alunecarea zăpezii din partea superioară, riscul fiind amplificat la supraîncărcări - risc **moderat (2)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 16.01.2026 ora 20 - 19.01.2026 ora 20

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVUL CEAHLĂU


RISC 2 - MODERAT



Stratul de zăpadă este mai consistent la altitudini de peste 1500 m, pe unele văi umbrite întâlnindu-se depozite mai însemnate. Răcirea vremii va duce la o consolidare a stratului. Vor fi condiții pentru unele avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat medii pe pantele mai înclinate, prin alunecarea zăpezii din partea superioară, riscul fiind prezent la supraîncărcări - risc **moderat (2)**.

CARPAȚII OCCIDENTALI

RISC 2 - MODERAT



Stratul de zăpadă măsoară local peste 30-40 cm, iar depozite mai importante de zăpadă se întâlnesc pe văile adăpostite. În partea superioară zăpada s-a compactat, iar în apropierea creștelor se întâlnesc plăci de vânt. Zăpada este umezită, iar răcirea accentuată a vremii va duce la consolidarea ei treptată. Pe pantele înclinate, mai ales la suprasarcini, va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat medii, care să angreneze zăpada din partea superioară, precum și plăcile de vânt formate în apropierea creștelor. Riscul de avalanșă va fi **moderat(2)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 16.01.2026 ora 20 - 19.01.2026 ora 20

EVOLUȚIA VREMII DIN ULTIMELE 2 ZILE

Vremea a fost în general închisă, cu cerul mai mult noros și cu temperaturi situate peste mediile perioadei în masivele sud-vestice, unde s-au semnalat precipitații mixte sub 1600 m și ninsori în zonele înalte. În masivele nordice și estice temperaturile au fost apropiate de norme și au predominant ninsorile. Cantitățile de precipitații au depășit pe arii restrânse 10 l/mp în Carpații Meridionali, de Curbură, și în sudul celor Occidentali. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări temporare de 40-60 km/h în majoritatea masivelor și cu rafale de 70-80 km/h pe crestele montane, viscolind zăpada. S-a semnalat local ceață, asociată izolat și cu depuneri de chiciură. Stratul de zăpadă a crescut local cu 10...15 cm pe versanții nordici ai Carpaților Meridionali și în Carpații de Curbură, iar în restul masivelor a marcat creșteri de câțiva centimetri, exceptând zonele joase din masivele sud-vestice unde a înregistrat scăderi pe fondul temperaturilor ușor pozitive sau al precipitațiilor parțial lichide.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsura, în data de 16.01.2026, ora 14:

Carpații Meridionali: 155 cm la Vârful Omu, 139 cm la Bâlea-Lac, 80 cm la Țarcu, 50 cm la Cuntu, 37 cm la Sinaia, 32 cm la Parâng, 28 cm la Păltiniș, 23 cm la Predeal, 20 cm la Fundata și 10 cm la Voineasa.

Carpații Orientali: 59 cm la Călimani, 57 cm la Lăcăuți, 49 cm la Bucin, 38 cm la Iezer-Rodnei, 27 cm la Ceahlău, 25 cm la Penteleu, 15 cm la Poiana Stampei

Carpații Occidentali: 60 cm la Semenice, 50 cm la Stâna de Vale, 48 cm la Roșia Montană, 44 cm la Băișoara, 15 cm la Vlădeasa 1800

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 16.01.2026 ora 20 - 19.01.2026 ora 20

Vremea va fi rece, geroasă noaptea și dimineța, cu temperaturi în scădere ușoară de la o zi la alta. Cerul va fi variabil. Izolat se vor mai semna ninsori slabe în noaptea de 16/17 ianuarie. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zonele înalte. Pe arii restrânse se va forma ceață, asociată izolat și cu depuneri de chiciură.

Temperaturi prognozate în intervalul 16.01.2026 ora 20 - 19.01.2026 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în general între -16...-10 grade

temperaturi maxime: în general -9 ...-4 grad

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în general între -12...-7 grade

temperaturi maxime: în general -7.... -1 grad

mtg. Udo Reckerth

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc