





Buletin nivometeorologic pentru perioada: 23.01.2026 ora 20 - 26.01.2026 ora 20



MUNȚII FĂGĂRAȘ ȘI BUCEGI

RISC 3 - ÎNSEMNAȚ






La peste 1800 m: Temperatura aerului va înregistra o creștere semnificativă în următoarele zile, ceea ce va duce la umezirea și îngreunarea stratului de zăpadă în partea sa superioară, mai ales la altitudini de 1800-2300 m. La suprafață vom regăsi unele cruste de gheață, în special noaptea și dimineața, care vor ceda însă pe fondul încălzirii diurne, iar în profunzime se întâlnește un strat compus din cristale fine și fațetate, care se va umezi treptat. În zona creștelor se mențin plăcile mai vechi de vânt, pe versanți cu orientări diferite și sunt formate cornișe, unele de mari dimensiuni. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, local de peste 2 metri. Spre sol se regăsesc cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate și în special la supraîncărcări mari ale zăpezii alunecarea straturilor superioare și genera unele avalanșe de dimensiuni mai mari. Începând cu noaptea de 25/26 ianuarie se va depune un nou strat de zăpadă, local consistent. Pe pantele înclinate pot apărea curgeri și va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari, care să angreneze stratul incomplet stabilizat din partea superioară și pe alocuri cel subiacent, precum și unele plăci de vânt formate în zonele înalte - risc **însemnat (3)**.

Sub 1800 m: Stratul de zăpadă are dimensiuni local de 30..50 cm, iar în zonele adăpostite sunt depozite mari, de izolat de 1...2 m, în special la altitudini de peste 1600 m. Temperaturile diurne ridicate vor umezi stratul în profunzime. Sunt condiții pentru apariția unor curgeri și producerea de avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii, în special la altitudini de 1600-1800 m, cu precădere la supraîncărcări ale stratului - risc **moderat(2)**.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 23.01.2026 ora 20 - 26.01.2026 ora 20

CARPAȚII MERIDIONALI: MUNȚII ȚARCU-GODEANU, PARÂNG-ȘUREANU

RISC 3- ÎNSEMENAT






La peste 1800 m: Temperaturile în creștere accentuată din următoarele zile vor duce la umezirea stratului actual în primii 20...30 cm, care se va îngreuna, crescând riscul unor curgeri pe anumite pante sau văi. În zona creștelor s-au păstrat plăcile de vânt existente, pe versanți cu orientări diferite și se regăsesc unele cornișe de mari dimensiuni, care prin rupere sunt un factor de risc în declanșarea unor avalanșe. Începând cu noaptea de 25/26 ianuarie sunt așteptate ninsori în zona creștelor, care vor depune un strat nou de zăpadă, local consistent. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, depășind izolat 1.5 metri. Spre sol se regăsesc cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate alunecarea straturilor superioare și genera unele avalanșe de dimensiuni medii. Pe pantele înclinate se va menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari, care să angreneze stratul superior și unele straturi subiacente, precum și plăcile de vânt formate în zonele înalte, atât spontan, cât mai ales la suprasarcini - risc **însemnat(3)**.

Sub 1800 m: Stratul de zăpadă este pe alocuri consistent, atingând 30..40 cm și izolat chiar mai mult pe anumite văi adăpostite aflate aproape de 1700-1800 m. Temperaturile ridicate din următoarele zile vor favoriza umezirea puternică a zăpezii, astfel încât stratul superior poate aluneca peste cel vechi și întărit de la baza stratului, ducând la declanșarea de curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii, în special la altitudini de 1600-1800 m - risc **moderat(2)**.

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVELE RODNEI, CĂLIMANI-BISTRIȚEI

RISC 2- MODERAT



La peste 1800 m: În partea superioară a zăpezii întâlnim cruste de gheață dar și areale cu un strat incomplet stabilizat în primii 20 cm, care se va umezi pe fondul creșterilor de temperatură din următoarele zile. Depozite mai consistente se întâlnesc pe văile adăpostite, iar în zonele înalte sunt numeroase plăci de vânt. Pe pantele înclinate va exista riscul unor curgeri sau declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii, mai ales în masivele nordice, care să angreneze plăcile de vânt prezente în zona creștelor și stratul incomplet stabilizat și umezit din partea superioară, mai ales la suprasarcini. Riscul va fi **moderat(2)**.


Sub 1800 m: stratul de zăpadă este mai consistent la altitudini de peste 1500 m și pe versanții vestici, iar pe unele văi umbrite se întâlnesc depozite mai însemnate. Stratul se va umezi în profunzime datorită temperaturilor diurne pozitive, iar noaptea se va forma o crustă de gheață la suprafață pe fondul temperaturilor ușor negative. Se mențin condițiile pentru unele curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și izolat chiar medii pe unele văi cu depozite mai consistente, prin alunecarea zăpezii din partea superioară, riscul fiind prezent la supraîncărcări - risc **moderat(2)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 23.01.2026 ora 20 - 26.01.2026 ora 20

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVUL CEAHLĂU


RISC 2 - MODERAT



Trecător se vor semna precipitații mixte slabe, iar temperatura va crește treptat, ceea ce va duce la umezirea stratului de zăpadă. Stratul este mai consistent la altitudini de peste 1500 m, pe unele văi umbrite întâlnindu-se depozite mai însemnate. Stratul superior, cu rezistență medie în primii 10..15 cm, poate aluneca pe anumite pante peste cel vechi și întărit. Vor fi condiții pentru unele curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii pe pantele mai înclinate, prin alunecarea zăpezii din partea superioară, riscul fiind prezent în special la supraîncărcări - risc **moderat (2)**.

CARPAȚII OCCIDENTALI

RISC 2 - MODERAT



Stratul de zăpadă măsoară local 30-40 cm, cu unele depozite mai importante de zăpadă pe văile adăpostite, iar spre creste sunt formate plăci de vânt. Zăpada se va umezi substanțial pe fondul vremii în încălzire și datorită temperaturilor diurne pozitive. Pe pantele înclinate va exista riscul declanșării unor curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii, care să angreneze zăpada din partea superioară, precum și plăcile de vânt formate în apropierea creștelor, mai ales la suprasarcini. Riscul de avalanșă va fi **moderat(2)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 23.01.2026 ora 20 - 26.01.2026 ora 20

EVOLUȚIA VREMII DIN ULTIMELE 3 ZILE

Temperaturile s-au situat ușor peste cele obișnuite ale perioadei. Cerul a fost parțial noros și temporar s-au semnalat precipitații slabe, predominant ninsori. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări temporare de 50-70 km/h în zonele înalte, pentru scurt timp cu rafale de 80-100 km/h pe crestele din Bucegi. Local s-a semnalat ceață, asociată izolat cu chiciură
Stratul de zăpadă a crescut ușor în majoritatea masivelor, în medie cu 1-3 cm.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsură, în data de 23.01.2026, ora 14:

Carpații Meridionali: 152 cm la Vârful Omu, 126 cm la Bâlea-Lac, 81 cm la Țarcu, 52 cm la Cuntu, 42 cm la Sinaia, 30 cm la Parâng, 27 cm la Păltiniș, 23 cm la Predeal, 21 cm la Fundata și 10 cm la Voineasa.

Carpații Orientali: 59 cm la Lăcăuți, 56 cm la Călimani, 48 cm la Bucin, 36 cm la Iezer-Rodnei, 26 cm la Ceahlău, 25 cm la Penteleu, 19 cm la Poiana Stampei

Carpații Occidentali: 46 cm la Semenice, 42 cm la Stâna de Vale, 40 cm la Roșia Montană, 54 cm la Băișoara, 12 cm la Vlădeasa 1800

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 23.01.2026 ora 20 - 26.01.2026 ora 20

Temperaturile vor crește în următoarele zile, la valori predominant pozitive la orele amiezilor, exceptând crestele cele mai înalte din Carpații Meridionali. Cerul va fi temporar noros. În primele 48 de ore, pe arii restrânse se vor semnala precipitații mixte slabe, ploi la altitudini joase, ce pot depune polei și trecător ninsori în zonele înalte, cu precădere în nordul Carpaților Orientali și pe crestele Meridionalilor. Începând din seara zilei de duminică, 25 ianuarie, aria precipitațiilor se va extinde și se vor semnala în special ploi sub 1800 m, iar la altitudini de peste 1800 m lapoviță și ninsoare, cu depunerea unui strat consistent de zăpadă în Carpații Meridionali. Căderile de apă vor depăși în noaptea de 25/26 ianuarie și în ziua de 26 ianuarie în Carpații Occidentali și Meridionali local 15-20 l/mp și pe alocuri 25-30 l/mp. Vântul se va intensifica treptat, la viteze de 60...70 km/h pe crestele Meridionalilor în cursul zilei de 24 ianuarie, iar pe parcursul zilelor de 25 și 26 ianuarie cu viteze de 60-80 km/h în toate masivele și cu rafale ce vor atinge 90-100 km/h pe creste, viscolind ninsoarea. Local se va semnala ceață.

Temperaturi prognozate în intervalul 23.01.2026 ora 20 - 26.01.2026 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în creștere treptată de la -8...-4 grade la -4..1 grad

temperaturi maxime: în general între -2 ...3 grade

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în creștere treptată de la -6...-1 grad la -1..3 grade

temperaturi maxime: în general între 2...7 grade

mtg. Udo Reckerth

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc