





Buletin nivometeorologic pentru perioada: 09.02.2026 ora 20 - 11.02.2026 ora 20



MUNȚII ȚARCU-GODEANU și BUCEGI

RISC 3 - ÎNSEMNAȚ



La peste 1800 m: În zona creștelor se întâlnesc numeroase plăci de vânt, pe versanți cu orientări diferite, cele mai recente fiind formate pe versanții nordici, din care unele consistente, iar la suprafață câțiva centimetri de zăpadă proaspătă. Stratul de zăpadă prezintă în continuare o rezistență medie în primii 30 cm, iar în profunzime întâlnim atât cruste de gheață, cât și zone cu de cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate și în special la supraîncărcări ale zăpezii alunecarea straturilor superioare. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, local de peste 2 metri. În zona creștelor sunt formate cornișe. Pe pantele înclinate și mai ales la supraîncărcări va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari, care să angreneze stratul relativ recent depus, cel mediu stabilizat din partea superioară și pe alocuri unele din profunzime, precum și unele plăci de vânt formate în zonele înalte - risc **însemnat (3)**.

Sub 1800 m: Stratul de zăpadă e mai consistent la altitudini de 1500-1800 m, în special pe versanții sud-estici ai masivelor Ţarcu-Godeanu și Bucegi și este parțial umezit. Scăderea temperaturii la valori predominant negative va induce treptat o ușoară consolidare în strat și unele ninsori înspre altitudini joase. O creștere de temperatură la valori pozitive este așteptată în ziua de 11 februarie, ceea ce va aduce o umezire ușoară a stratului. Se pot declanșa avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii, mai ales spre altitudini de 1600-1800 m, riscul fiind prezent în special la supraîncărcări ale stratului - risc **moderat(2)**.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 09.02.2026 ora 20 - 11.02.2026 ora 20




METEO



ROMANIA

CARPAȚII MERIDIONALI: PARÂNG-ȘUREANU ȘI FĂGĂRAȘ

RISC 3- ÎNSEMENAT






La peste 1800 m: În partea superioară a zăpezii s-au depus local 5..10 cm de zăpadă, iar temporar va mai ninge slab. În zona creștelor se întâlnesc plăci de vânt mai vechi, pe versanți cu orientări diferite și unele mai recente pe versanții nordici. Stratul de zăpadă se menține pe alocuri instabil în primii 30 cm. În profunzime regăsim câteva cruste de gheață și zone cu cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate apariția unor avalanșe care să angreneze straturile de deasupra. Pe alocuri sunt formate cornișe. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, depășind izolat 1.5-2 metri. Pe pantele înclinate, mai ales la supraîncărcări, se va menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari, care să angreneze stratul de zăpadă proaspătă, cel subiacent pe alocuri încă instabil, precum și unele straturi din profunzime sau plăcile de vânt formate în zonele înalte - risc **însemnat(3)**.

Sub 1800 m:

Stratul de zăpadă este local consistent, în special pe versanții sudici, la altitudini de peste 1500 m. Stratul este parțial umezit, dar o nouă răcire a vremii va aduce ninsori înspre altitudini joase. Vor fi condiții pentru avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii, în special la altitudini de 1600-1800 m, cu precădere la supraîncărcări ale stratului - risc **moderat(2)**.

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVELE RODNEI, CĂLIMANI-BISTRITELI

RISC 2- MODERAT



La peste 1800 m: Temperaturile se mențin scăzute, la valori negative, iar trecător va mai ninge slab. În partea superioară a zăpezii vom întâlni în continuare un strat redus de zăpadă recentă și unele cruste de gheață, iar în profunzime un strat care s-a consolidat ușor în primii 20-30 cm. În zona creștelor se întâlnesc plăci mai vechi de vânt, de grosimi variabile. Depozite mai consistente se întâlnesc pe văile adăpostite. Pe pantele înclinate va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii, care să angreneze plăcile de vânt prezente în zona creștelor și stratul incomplet stabilizat din partea superioară, mai ales la suprasarcini. Riscul va fi **moderat(2)**.


Sub 1800 m: stratul de zăpadă este mai consistent la altitudini de peste 1500 m, iar pe unele văi umbrite se întâlnesc depozite însemnate. Zăpada se va consolida ușor pe fondul temperaturilor scăzute, iar la suprafață se vor forma cruste temporare de îngheț. Se mențin condițiile pentru unele avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat medii pe unele văi apropiate de 1800 m, cu depozite mai consistente, riscul fiind prezent la supraîncărcări - risc **moderat(2)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 09.02.2026 ora 20 - 11.02.2026 ora 20

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVUL CEAHLĂU


RISC 1 - REDUS



În partea superioară a stratului s-au depus câțiva centimetri de zăpadă proaspătă, iar trecător se vor mai semnala ninsori slabe. Temperaturile se mențin preponderent negative. Izolat vor fi condiții pentru unele avalanșe de dimensiuni mici pe pantele mai înclinate, prin alunecarea stratului de zăpadă proaspătă incomplet stabilizat din partea superioară, riscul fiind prezent la supraîncărcări - risc **redus (1)**.

CARPAȚII OCCIDENTALI

RISC 2 - MODERAT



Stratul de zăpadă a crescut ușor în ultimele zile, depășind pe alocuri 30 cm ca grosime, cu unele depozite mai importante de zăpadă pe văile adăpostite. Zăpada umezită s-a consolidat ușor pe fondul răcirii vremii. Cu toate acestea, pe pantele înclinate se menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat medii, care să angreneze zăpada din partea superioară, precum și unele plăci de vânt mai vechi din apropierea creștelor, mai ales la suprasarcini. Riscul de avalanșă va fi **moderat(2)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 09.02.2026 ora 20 - 11.02.2026 ora 20

EVOLUȚIA VREMII DIN ULTIMELE 3 ZILE

Vremea s-a situat la începutul intervalului peste normalul termic al perioadei, apoi s-a răcit. Cerul a fost temporar noros. Pe arii relativ extinse s-au semnalat precipitații, în general slabe. La altitudini de sub 1600 m temporar au fost precipitații sub formă de ploaie și lapoviță în prima parte a intervalului, iar în zonele înalte a nins, pe alocuri viscolit. În ultima zi din interval a nins și la altitudini de sub 1600 m. Cantitățile de apă au atins pe arii restrânse 10-15 l/mp. Vântul a suflat slab și moderat, cu unele intensificări temporare de 50-70 km/h pe crestele masivelor vestice și nord-vestice. Local s-a semnalat ceață, asociată și cu depuneri de chiciură pe creste.

Stratul de zăpadă a crescut cu până la 11 cm pe versanții nordici din Munții Făgăraș, cu până la 8 cm în Munții Călimani, și doar cu câțiva cm în zonele înalte din masivele Carpaților Orientali și Occidentali, scăzând ușor sub 1600 m în masivele vestice și sudice.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsura, în data de 09.02.2026, ora 14:

Carpații Meridionali: 169 cm la Vârful Omu, 137 cm la Bâlea-Lac, 116 cm la Țarcu, 35 cm la Cuntu, 39 cm la Sinaia, 22 cm la Parâng, 24 cm la Păltiniș, 8 cm la Predeal, 11 cm la Fundata.

Carpații Orientali: 53 cm la Lăcăuți, 72 cm la Călimani, 39 cm la Bucin, 33 cm la Iezer-Rodnei, 31 cm la Ceahlău, 6 cm la Poiana Stampei, 30 cm la Penteleu

Carpații Occidentali: 46 cm la Semenice, 46 cm la Băișoara, 31 cm la Stâna de Vale, 12 cm la Roșia Montană, 33 cm la Vlădeasa 1800

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 09.02.2026 ora 20 - 11.02.2026 ora 20

Vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei, iar în cursul zilei de 11 februarie se va încălzi ușor. Cerul va avea unele înnorări mai accentuate în masivele sudice și vestice. Temporar în Carpații Meridionali și în sudul celor Occidentali și trecător în restul masivelor va ninge, moderat cantitativ în masivele sud-vestice. În ziua de 11 februarie se vor mai semnala numai izolat precipitații mixte slabe. Cantitățile de apă vor atinge pe alocuri 5-10 l/mp în sud-vestul Carpaților Meridionali și în sudul celor Occidentali, unde se va depune un strat nou de zăpadă, local de peste 5..10 cm. Vântul va prezenta unele intensificări temporare de 40-60 km/h din sector sud-vestic în zonele înalte din toate masivele, cu rafale ce vor atinge 70-90 km/h pe crestele Meridionalilor. Local se va semnala ceață, asociată izolat cu depuneri de chiciură pe creste.

Temperaturi prognozate în intervalul 09.02.2026 ora 20 - 11.02.2026 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în creștere de la -13...-8 grade spre -10...-6 grade

temperaturi maxime: în creștere de la -8...-3 grade spre -4...1 grad

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în creștere de la -11...-5 grade spre -7...-3 grade

temperaturi maxime: în creștere de la -6...0 grade spre -2...4 grade

mtg. Udo Reckerth

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc