





Buletin nivometeorologic pentru perioada: 11.02.2026 ora 20 - 13.02.2026 ora 20



MUNȚII FĂGĂRAȘ ȘI BUCEGI

RISC 3 - ÎNSEMNAȚ



La peste 1800 m: Temperaturile diurne vor fi ușor pozitive la altitudini de 1800-2100 m, ceea ce va duce la umezirea și îngreunarea zăpezii în stratul superficial de la aceste altitudini și la apariția unor curgeri. În zona creștelor se întâlnesc numeroase plăci de vânt, pe versanți cu orientări diferite, cele mai recente fiind formate pe versanții nordici, din care unele consistente. Stratul de zăpadă prezintă o rezistență medie în primii 30 cm, iar în profunzime întâlnim atât cruste de gheață, cât și zone cu de cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate și în special la supraîncărcări ale zăpezii alunecarea straturilor superioare. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, local de peste 2 metri. În zona creștelor sunt formate cornișe. Pe pantele înclinate și mai ales la supraîncărcări va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari, care să angreneze straturile superficiale și pe alocuri unele din profunzime, precum și unele plăci de vânt formate în zonele înalte - risc **însemnat (3)**.

Sub 1800 m: Stratul de zăpadă e mai consistent la altitudini de 1500-1800 m, în special pe versanții sud-estici ai masivului Bucegi și este parțial umezit. Creșterea temperaturilor diurne la valori pozitive va duce treptat o umezire și îngreunare a stratului și la potențiale curgeri. În cursul nopții se vor forma cruste de îngheț la suprafața stratului prin coborârea temperaturilor la valori negative. Se pot declanșa avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii, mai ales spre altitudini de 1600-1800 m, riscul fiind prezent în special la supraîncărcări ale stratului - risc **moderat(2)**.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 11.02.2026 ora 20 - 13.02.2026 ora 20




METEO



ROMANIA

CARPAȚII MERIDIONALI: ȚARCU-GODEANU ȘI PARÂNG-ȘUREANU

RISC 3- ÎNSEMNAT






La peste 1800 m: În masivele Țarcu și Godeanu în partea superioară a zăpezii întâlnim un strat de zăpadă proaspătă, local de peste 10 cm grosime. Încălzirea vremii va aduce temperaturi diurne ușor pozitive la orele prânzului la altitudini de 1800-2100 m, ce vor determina umezirea și îngreunarea stratului superior și unele curgeri izolate. În zona creștelor se întâlnesc plăci de vânt mai vechi, pe versanți cu orientări diferite, unele mai recente pe versanții nordici. Stratul de zăpadă se menține pe alocuri instabil în primii 30 cm. În profunzime regăsim câteva cruste de gheață și zone cu cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate apariția unor avalanșe care să angreneze straturile de deasupra. Pe alocuri sunt formate cornișe. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, depășind izolat 2 metri. Pe pantele înclinate, mai ales la supraîncărcări, se va menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari, care să angreneze stratul de zăpadă proaspătă, cel subiacent pe alocuri încă instabil, precum și unele straturi din profunzime sau plăcile de vânt formate în zonele înalte - risc **însemnat(3)**.

Sub 1800 m:

Stratul de zăpadă este local consistent, în special pe versanții sudici, la altitudini de peste 1500 m. Stratul se va umezi pe fondul creșterii diurne de temperatură, dar temperaturile nocturne negative vor produce o crustă temporară de îngheț la suprafața stratului. Vor fi condiții pentru curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii, în special la altitudini de 1600-1800 m, cu precădere la supraîncărcări ale stratului - risc **moderat(2)**.

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVELE RODNEI, CĂLIMANI-BISTRITELI

RISC 2- MODERAT



La peste 1800 m: Deși s-a consolidat ușor în ultima perioadă, în partea superioară a zăpezii vom întâlni în continuare un strat incomplet stabilizat în primii 20-30 cm și care se va umezi și îngreuna pe fondul creșterii temperaturii diurne la valori ușor pozitive între 1800 și 2100 m. În profunzime regăsim cruste mai vechi de gheață, dar izolat și zone cu cristale tip cupă, ce se pot constitui în planuri de alunecare pentru zăpada de deasupra. În zona creștelor se întâlnesc plăci mai vechi de vânt, de grosimi variabile. Depozite mai consistente se întâlnesc pe văile adăpostite. Pe pantele înclinate va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii, care să angreneze plăcile de vânt prezente în zona creștelor și stratul incomplet stabilizat din partea superioară, mai ales la suprasarcini. Riscul va fi **moderat(2)**.


Sub 1800 m: stratul de zăpadă este mai consistent la altitudini de peste 1500 m, iar pe unele văi umbrite se întâlnesc depozite însemnate. Zăpada se va umezi și îngreuna pe fondul temperaturilor diurne pozitive, iar la suprafață se vor forma la orele dimineții cruste temporare de îngheț. Se mențin condițiile pentru unele curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat medii pe unele văi apropiate de 1800 m, cu depozite mai consistente, riscul fiind prezent la supraîncărcări - risc **moderat(2)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 11.02.2026 ora 20 - 13.02.2026 ora 20

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVUL CEAHLĂU


RISC 1 - REDUS



Stratul este în ansamblu stabilizat, dar creșterea temperaturilor diurne din zilele următoare va determina umezirea și îngreunarea stratului și apariția unor curgeri izolate. Pe parcursul nopților temperaturile vor fi negative și la suprafața stratului se vor forma unele cruste de îngheț. Izolat vor fi condiții pentru unele avalanșe de dimensiuni mici pe pantele mai înclinate, prin alunecarea stratului de zăpadă proaspătă incomplet stabilizat din partea superioară, riscul fiind prezent la supraîncărcări - risc **redus (1)**.

CARPAȚII OCCIDENTALI

RISC 2 - MODERAT



Stratul de zăpadă este în continuare consistent, depășind pe alocuri 30-35 cm ca grosime, cu unele depozite mai importante de zăpadă pe văile adăpostite. Zăpada se va umezi și îngreuna pe fondul încălzirii vremii. În cursul nopții se vor forma cruste de îngheț la suprafața stratului prin coborârea temperaturilor la valori negative. Pe pantele înclinate va exista riscul apariției unor curgeri sau al declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat medii, care să angreneze zăpada din partea superioară, precum și unele plăci de vânt mai vechi din apropierea creștelor, mai ales la suprasarcini. Riscul de avalanșă va fi **moderat(2)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 11.02.2026 ora 20 - 13.02.2026 ora 20

EVOLUȚIA VREMII DIN ULTIMELE 3 ZILE

Vremea a fost apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul a fost temporar noros. Pe arii relativ extinse în masivele sudice și vestice și local în rest, s-au semnalat ninsori, viscolite în zonele înalte. Cantitățile de apă au atins izolat 10-15 l/mp în masivele sud-vestice. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări temporare de 40-60 km/h în toate masivele, trecător cu 70-80 kmh pe crestele Carpaților Meridionali din Apuseni. Local s-a semnalat ceață, asociată și cu depuneri de chiciură.

Stratul de zăpadă a crescut cu până la 10 cm în masivele Țarcu-Godeanu, local cu 5 cm în zonele înalte din restul Meridionalilor, având variații nesemnificative în rest.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsura, în data de 11.02.2026, ora 14:

Carpații Meridionali: 165 cm la Vârful Omu, 142 cm la Bâlea-Lac, 126 cm la Țarcu, 35 cm la Cuntu, 39 cm la Sinaia, 25 cm la Parâng, 23 cm la Păltiniș, 8 cm la Predeal, 13 cm la Fundata.

Carpații Orientali: 56 cm la Lăcăuți, 73 cm la Călimani, 38 cm la Bucin, 33 cm la Iezer-Rodnei, 30 cm la Ceahlău, 6 cm la Poiana Stampei, 31 cm la Penteleu

Carpații Occidentali: 46 cm la Semenic, 46 cm la Băișoara, 31 cm la Stâna de Vale, 12 cm la Roșia Montană, 33 cm la Vlădeasa 1800

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 11.02.2026 ora 20 - 13.02.2026 ora 20

Vremea va fi caracterizată de temperaturi peste cele normale perioadei. Cerul va fi temporar noros. Local se vor semnala precipitații mixte slabe, cu precădere în Carpații Occidentali, în nordul celor Orientali, în vestul celor Meridionali și pe versanții sudici ai masivelor sud-estice. Stratul de zăpadă va diminua la altitudini de sub 2000 m și nu va suferi variații importante în zona creștelor. Vântul va prezenta unele intensificări temporare de 40-60 km/h în zonele înalte din toate masivele, cu rafale ce vor atinge și depăși trecător 70 km/h pe crestele Meridionalilor. Local se va semnala ceață.

Temperaturi prognozate în intervalul 11.02.2026 ora 20 - 13.02.2026 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în general între -7...-3 grade

temperaturi maxime: în general între -2...3 grade

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în general între -4...1 grad

temperaturi maxime: în general între 2...7 grade

mtg. Udo Reckerth

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc