




Buletin nivometeorologic pentru perioada: 20.02.2026 ora 20 - 23.02.2026 ora 20



MUNȚII FĂGĂRAȘ ȘI BUCEGI

RISC 4 - MARE






La peste 1800 m: În partea superioară a zăpezii întâlnim un strat de zăpadă recent acumulată și instabilă, umezită la altitudini apropiate de 1800 m, cu grosimi de 20..40 cm și local mai mult pe văile unde a fost transportată de vânt, cu rezistență scăzută și coeziune slabă cu straturile mai vechi, subiacente. În următorul interval se vor semnala ninsori moderate cantitativ, ce vor mai depune local 10..20 cm de zăpadă proaspătă. În zona creștelor se întâlnesc numeroase plăci de vânt, friabile și de grosimi importante, pe versanți cu orientări diferite, cei mai expuși fiind versanții nordici, estici și sudici. În profunzime întâlnim atât cruste de gheață, cât și zone cu de cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate și în special la supraîncărcări ale zăpezii alunecarea straturilor superioare. Pe multe văi depozitele de zăpadă sunt consistente, local de peste 2 metri. În zona creștelor sunt formate cornișe de mari dimensiuni. Pe pantele înclinate va exista riscul declanșării avalanșelor de dimensiuni medii și mari, atât spontan, cât mai ales la supraîncărcări ale stratului cu turiști sau schiori, care să angreneze stratul consistent de zăpadă proaspătă, plăcile de vânt, iar în cazuri izolate unele din profunzime - risc **mare(4)**.

Sub 1800 m: Stratul de zăpadă proaspătă e consistent și umezit, depășind local 25..35 cm, chiar și la altitudini joase. Se vor semnala ninsori moderate, ce vor mai depune local 10..15 cm de zăpadă și izolat mai mult. Se pot declanșa curgeri la altitudini apropiate de 1500 m sau avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari înspre 1800 m, riscul fiind amplificat la supraîncărcări ale stratului - risc **însemnat (3)**.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 20.02.2026 ora 20 - 23.02.2026 ora 20

CARPAȚII MERIDIONALI: ȚARCU-GODEANU ȘI PARÂNG-ȘUREANU

RISC 4- MARE






La peste 1800 m: În partea superioară a stratului întâlnim un strat de 20..30 cm de zăpadă recentă, umezită la altitudini apropiate de 1800 m și depusă peste un strat de zăpadă, acumulat în perioada ce a precedat ultimele ninsori consistente, în medie de 10 cm grosime și chiar mai mult în masivele Țarcu și Godeanu. În următorul interval va continua să ningă și se vor mai depune local 10..15 cm de zăpadă proaspătă. În zona creștelor se întâlnesc plăci de vânt pe versanți cu orientări diferite, cei mai expuși fiind versanții nordici, estici și sudici. Stratul de zăpadă este astfel instabil în primii 30..40 cm, iar în profunzime regăsim câteva cruste de gheață și zone cu cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate apariția unor avalanșe care să angreneze straturile de deasupra. Pe alocuri sunt formate cornișe, unele de mari dimensiuni. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, depășind local 2 metri. Pe pantele înclinate, atât spontan, cât mai ales la supraîncărcări, există riscul declanșărilor de avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari, care să angreneze stratul de zăpadă cu rezistență scăzută din partea superioară, plăcile de vânt formate în zonele înalte, precum și unele straturi din profunzime - risc **mare(4)**.

Sub 1800 m:

Stratul de zăpadă este consistent și înspre altitudini joase, depășind local 20..30 cm, cu acumulări mai importante pe unele văi. Zăpada este umedă, iar temporar va mai ninge moderat și stratul va mai crește pe alocuri cu peste 10 cm. Vor fi condiții pentru avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari la altitudini de 1500-1800 m, cu precădere la supraîncărcări ale stratului. Riscul va fi **însemnat(3)**.

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVELE RODNEI, CĂLIMANI-BISTRITELI

RISC 3- ÎNSEMNAȚ



La peste 1800 m: În partea superioară a zăpezii întâlnim un strat de de zăpadă recent acumulată, local de peste 10 cm, iar dedesubt un strat mai vechi, incomplet stabilizat în primii 20-30 cm. Se vor mai semnala ninsori slabe, ce vor depune local 5 cm de zăpadă proaspătă. În profunzime regăsim cruste mai vechi de gheață, dar izolat și zone cu cristale tip cupă, ce se pot constitui în planuri de alunecare pentru zăpada de deasupra. În zona creștelor se întâlnesc plăci de vânt, de grosimi variabile, pe versanți cu orientări diferite(N, NE, E, SE, S). Depozite mai consistente se întâlnesc pe văile adăpostite. Pe pantele înclinate va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii, care să angreneze plăcile de vânt prezente în zona creștelor și stratul incomplet stabilizat din partea superioară, inclusiv cel ce de pulver acumulat în ultimele zile și care se va mai depune, riscul fiind prezent mai ales la suprasarcini și **însemnat(3)**.


Sub 1800 m: deși a nins spre altitudini joase, stratul de zăpadă este mai consistent la altitudini de peste 1500 m, iar pe unele văi se întâlnesc depozite însemnate. Temporar se vor semnala ninsori slabe, ce vor mai depune local 5 cm de zăpadă proaspătă. Se mențin condițiile pentru avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat medii pe unele văi apropiate de 1800 m, cu depozite mai consistente, riscul fiind prezent la supraîncărcări - risc **moderat(2)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 20.02.2026 ora 20 - 23.02.2026 ora 20

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVUL CEAHLĂU


RISC 2 - MODERAT



În partea superioară a stratului întâlnim 5..10 cm de zăpadă recent acumulată, iar ninsorile ce vor urma vor fi în general slabe. Stratul de zăpadă acumulat în ultima perioadă este depus pe anumite pante peste vechea zăpadă, întărită, cu care are coeziune redusă. Izolat vor fi condiții pentru unele avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat medii pe pantele mai înclinate, prin alunecarea stratului de zăpadă proaspătă și pe alocuri a celui subiacent, incomplet stabilizat, riscul fiind prezent la supraîncărcări - risc **moderat (2)**.

CARPAȚII OCCIDENTALI

RISC 2 - MODERAT



Stratul de zăpadă este are grosimi de 25-35 cm și izolat mai mult pe anumiți versanți nordici, cu unele depozite mai importante de zăpadă pe văile adăpostite. Temporar se vor mai semnala ninsori moderate, iar stratul va înregistra unele creșteri, local de 5..10 cm. Pe pantele înclinate va exista riscul apariției unor curgeri la altitudini apropiate de 1500 m sau al declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat medii pe văile și pantele cu acumulări mai importante, care să angreneze zăpada incomplet stabilizată din partea superioară, precum și unele plăci de vânt din apropierea creștelor, mai ales la suprasarcini. Riscul de avalanșă va fi **moderat(2)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 20.02.2026 ora 20 - 23.02.2026 ora 20

EVOLUȚIA VREMII DIN ULTIMELE 2 ZILE

Vremea a fost caracterizată de temperaturi apropiate de cele normale ale perioadei, în creștere în ultimele 12 ore, fiind vântoasă în zonele înalte. Cerul a fost noros și local s-au semnalat ninsori, în general slabe. Cantitățile de precipitații au depășit izolat 10 l/mp în masivul Carpații Meridionali. Vântul a suflat moderat, intensificări temporare de 50-70 km/h în zonele înalte din toate masivele, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada și cu rafale ce au atins și depășit trecător 80-90 km/h pe creste și izolat 100-110 km/h pe crestele Meridionalilor. Local s-a semnalat ceață, asociată și cu depuneri de chiciură. Stratul de zăpadă scăzut ușor la altitudini de sub 1800 m, cu până la 12 cm la Fundata, iar în zonele înalte a avut unele oscilații, scăzând pe unele creste unde zăpada a fost transportată de vânt și crescând izolat cu 11 cm la Bâlea-Lac și cu 3..4 cm pe crestele Orientalilor.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsura, în data de 20.02.2026, ora 14:

Carpații Meridionali: 177 cm la Bâlea-Lac, 170 cm la Vârful Omu, 138 cm la Țarcu, 60 cm la Sinaia, 41 cm la Cuntu, 37 cm la Parâng, 36 cm la Păltiniș, 33 cm la Predeal, 29 cm la Fundata.

Carpații Orientali: 83 cm la Călimani, 76 cm la Lăcăuți, 45 cm la Bucin, 45 cm la Ceahlău, 36 cm la Iezer-Rodnei, 29 cm la Penteleu, 7 cm la Poiana Stampei

Carpații Occidentali: 76 cm la Semenice, 54 cm la Băișoara, 34 cm la Vlădeasa 1800, 29 cm la Stâna de Vale, 10 cm la Roșia Montană

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 20.02.2026 ora 20 - 23.02.2026 ora 20

Vremea se va răci ușor și se va încadra în limite termice normale pentru această dată. Cerul va fi temporar noros și va ninge moderat în toate masivele. La altitudini joase se poate semnală trecător lapoviță. Cantitățile de precipitații vor depăși local 10 l/mp în toate grupele montane și pe arii restrânse 15-20 l/mp, cu precădere în Carpații Meridionali și Occidentali. Stratul de zăpadă va înregistra creșteri locale de 5..10 cm în toate masivele și pe alocuri de peste 20 cm în masivele sudice. Vântul va prezenta intensificări temporare de 40-60 km/h în zonele înalte din toate masivele, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada, cu rafale ce vor atinge și depăși trecător 70-80 km/h în Carpații de Curbură în noaptea de 20/21 februarie. Local se va semnală ceață, asociată pe alocuri și cu depuneri de chiciură.

Temperaturi prognozate în intervalul 20.02.2026 ora 20 - 23.02.2026 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în general între -12..-8 grade

temperaturi maxime: în general între -7...-2 grade

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în general între -9..-5 grade

temperaturi maxime: în general între -3...2 grade

mtg. Udo Reckerth

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc