





Buletin nivometeorologic pentru perioada: 27.02.2026 ora 20 - 02.03.2026 ora 20



MUNȚII FĂGĂRAȘ ȘI BUCEGI

RISC 4 - MARE






La peste 1800 m: Stratul de zăpadă se menține instabil pe majoritatea versanților, iar creșterea temperaturilor diurne la valori ușor pozitive și insolația vor accentua gradul de instabilitate prin umezirea stratului superficial al zăpezii, ce va conduce la curgeri pe mai mulți versanți și care vor angrena local și straturi din profunzime. Ninsorile recente au depus 15..20 cm de zăpadă proaspătă, dar în partea superioară a zăpezii regăsim în continuare un strat de zăpadă instabil în primii 40..70 cm, constituit din depunerile succesive de zăpadă din a doua parte a lunii februarie, cu rezistență scăzută și coeziune slabă cu straturile mai vechi, subiacente. În zona creștelor se întâlnesc numeroase plăci de vânt, friabile și de grosimi importante, pe versanți cu orientări diferite, cei mai expuși fiind versanții nordici, estici și sudici. Pe multe văi depozitele de zăpadă sunt consistente, local de peste 2-3 metri. În zona creștelor sunt formate cornișe de mari dimensiuni. Noaptea și dimineața, la suprafața stratului se vor forma cruste temporare de îngheț și care vor ceda pe parcursul zilei. Pe pantele înclinate se vor semnaliza curgeri și va exista riscul declanșării avalanșelor de dimensiuni medii și mari, atât spontan, cât mai ales la supraîncărcări ale stratului cu turiști sau schiori, care să angreneze stratul consistent de zăpadă recent acumulată, plăcile de vânt, iar în cazuri izolate unele straturi din profunzime - risc **mare(4)**.

Sub 1800 m: Stratul de zăpadă e consistent și parțial umezit, depășind local 30..50 cm. Insolația și creșterea temperaturilor diurne vor duce la umezirea suplimentară și la tasarea stratului. Se vor declanșa curgeri, avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari înspre 1800 m, riscul fiind amplificat la supraîncărcări ale stratului - risc **însemnat (3)**.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 27.02.2026 ora 20 - 02.03.2026 ora 20

CARPAȚII MERIDIONALI: ȚARCU-GODEANU ȘI PARÂNG-ȘUREANU

RISC 4- MARE






La peste 1800 m: În partea superioară a zăpezii stratul de zăpadă recent acumulată depășește pe alocuri 25-30 cm, iar sub acesta regăsim un strat de 30..50 cm cu rezistență încă scăzută, constituit din depunerile succesive din a doua parte a lunii februarie. Insolația și creșterea temperaturii diurne la valori ușor pozitive la orele amiezilor vor duce la umezirea stratului superficial și la curgeri pe majoritatea versanților, ce vor angrena și unele straturi din profunzime. În zona creștelor se întâlnesc plăci de vânt pe versanți cu orientări diferite, cei mai expuși fiind versanții nordici, estici și sudici. În zona creștelor sunt formate cornișe de mari dimensiuni. Pe văi depozitele de zăpadă sunt consistente, depășind local 2 metri. Noaptea și dimineața, la suprafața stratului se vor forma cruste temporare de îngheț, ce vor ceda pe parcursul zilei. Pe pantele înclinate, atât spontan, cât mai ales la supraîncălcări, se vor semnala curgeri și pe alocuri avalanșe de dimensiuni medii și mari, care să angreneze straturile de zăpadă cu rezistență scăzută din partea superioară, plăcile de vânt formate în zonele înalte, precum și unele straturi din profunzime - risc **mare(4)**.

Sub 1800 m:

Stratul de zăpadă este consistent până înspre altitudini joase, umezit, acumulările din ultima perioadă depășind local 40..60 cm și izolat mai mult pe unele văi. Insolația și creșterea temperaturilor diurne vor duce la umezirea suplimentară și la tasarea stratului. Se vor semnala curgeri, avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari la altitudini de 1500-1800 m, cu precădere la supraîncălcări ale stratului. Riscul va fi **însemnat(3)**.

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVELE RODNEI, CĂLIMANI-BISTRITELI

RISC 3- ÎNSEMNAT



La peste 1800 m: Ninsorile din ultima perioadă au adus local 10..15 cm de zăpadă proaspătă, dar rafalele puternice de vânt au creat zone cu acumulări mai consistente. În partea superioară a zăpezii întâlnim astfel straturi succesive de zăpadă depuse în a doua parte a lunii februarie, ce prezintă în medie o rezistență scăzută în primii 30..40 cm. Sub aceștia regăsim un strat mai vechi, incomplet stabilizat. Insolația și creșterea temperaturilor la valori ușor pozitive la orele amiezilor vor duce la umezirea zăpezii și la apariția unor curgeri, în special pe versanții însoriți. În profunzime se întâlnesc cruste mai vechi de gheață, dar izolat și zone cu cristale tip cupă, ce se pot constitui în planuri de alunecare pentru zăpada de deasupra. În zona creștelor se întâlnesc plăci de vânt, de grosimi variabile, pe versanți cu orientări diferite(N, NE, E, SE, S). Depozite mai consistente se întâlnesc pe văile adăpostite, local de peste 2 metri. Pe pantele înclinate va exista riscul declanșării de curgeri sau de avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari, care să angreneze plăcile de vânt prezente în zona creștelor și stratul incomplet stabilizat din partea superioară, riscul fiind prezent mai ales la suprasarcini și **însemnat(3)**.


Sub 1800 m: stratul de zăpadă este mai consistent la altitudini de peste 1500 m, cu unele depozite mai însemnate pe anumite văi. Insolația și creșterea treptată a temperaturilor diurne vor duce la umezirea și tasarea stratului. Se mențin condițiile pentru avalanșe de dimensiuni mici și medii pe unele văi apropiate de 1800 m, cu depozite mai consistente, riscul fiind prezent la supraîncălcări - risc **moderat(2)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 27.02.2026 ora 20 - 02.03.2026 ora 20

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVUL CEAHLĂU


RISC 2 - MODERAT



În partea superioară a stratului întâlnim zone cu 15..20 cm de zăpadă acumulată în ultima parte a lunii februarie, care nu a avut timp de stabilizare este depus pe anumite pante peste vechea zăpadă, întărită, cu care are coeziune redusă. Insolația și creșterea temperaturilor diurne vor duce la umezirea și la tasarea stratului. Vor fi condiții pentru unele curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat medii pe pantele mai înclinate, prin alunecarea stratului de zăpadă proaspătă și pe alocuri a celui subiacent, incomplet stabilizat, riscul fiind prezent la supraîncărcări - risc **moderat (2)**.

CARPAȚII OCCIDENTALI

RISC 2 - MODERAT



Stratul de zăpadă a avut creșteri locale de 15..20 cm în ultima perioadă, având în medie grosimi de 30-40 cm și izolat mai mult pe anumiți versanți nordici, cu unele depozite mai importante de zăpadă pe văile adăpostite. Insolația și creșterea treptată a temperaturilor diurne vor duce la umezirea suplimentară și tasarea stratului. Pe pantele înclinate va exista riscul declanșării unor curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și medii pe văile și pantele cu acumulări mai importante, care să angreneze zăpada cu rezistență medie din partea superioară, precum și unele plăci de vânt din apropierea creștelor, mai ales la suprasarcini. Riscul de avalanșă va fi **moderat(2)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 27.02.2026 ora 20 - 02.03.2026 ora 20

EVOLUȚIA VREMII DIN ULTIMELE 2 ZILE

Noaptea de 25/26 a adus un ultim pasaj de ninsori în masivele montane și temperaturi sub pragul gerului în cea mai mare parte a zonei montane, cu ușoare creșteri de strat în zonele înalte din Carpații Meridionali, de până la 14 cm la Vârful Omu și cu rafale de vânt ce au atins 60-80 km/h în zonele înalte și trecător 90-120 km/h pe crestele Meridionalilor, local ceață și chiciură. Cantitățile de precipitații au fost în general slabe, moderate în masivele sud-estice. Ulterior cerul a devenit variabil, iar temperaturile au înregistrat creșteri constante, la valori pozitive astăzi, la orele prânzului, sub 1800 m, cu vânt în diminuare semnificativă. Stratul de zăpadă a scăzut în toate masivele, exceptând crestele Carpaților Meridionali.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsura, în data de 27.02.2026, ora 14:

Carpații Meridionali: 195 cm la Bâlea-Lac, 203 cm la Vârful Omu, 158 cm la Țarcu, 73 cm la Sinaia, 62 cm la Cuntu, 50 cm la Parâng, 45 cm la Păltiniș, 35 cm la Predeal, 33 cm la Fundata.

Carpații Orientali: 128 cm la Călimani, 96 cm la Lăcăuți, 57 cm la Bucin, 54 cm la Ceahlău, 46 cm la Iezer-Rodnei, 38 cm la Penteleu, 13 cm la Poiana Stampei

Carpații Occidentali: 88 cm la Semenic, 56 cm la Băișoara, 42 cm la Vlădeasa 1800, 38 cm la Stâna de Vale, 19 cm la Roșia Montană

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 27.02.2026 ora 20 - 02.03.2026 ora 20

Vremea va fi în general frumoasă și va continua să se încălzească, temperaturile diurne devenind pozitive la orele amiezii în cea mai mare parte a zonei montane, cu valori ce se vor apropia de 10 grade la altitudini apropiate de 1500 m, în special în masivele sudice și vestice. Cerul va fi variabil, mai mult senin. Stratul de zăpadă va înregistra scăderi în întreaga arie montană, mai accentuate la altitudini de sub 1800 m. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturi prognozate în intervalul 27.02.2026 ora 20 - 02.03.2026 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în creștere de la -8..-4 grade spre -5..0 grade

temperaturi maxime: în general între -1...6 grade

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în creștere de la -6..-1 grad spre -4..2 grade

temperaturi maxime: în general între 3...10 grade, izolat mai ridicate în masivele sud-vestice

mtg. Cristina Blaga

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc