





Buletin nivometeorologic pentru perioada: 06.03.2026 ora 20 - 09.03.2026 ora 20



MUNȚII FĂGĂRAȘ ȘI BUCEGI

RISC 3 - ÎNSEMNAȚ






La peste 1800 m: În partea superioară a zăpezii regăsim un strat de zăpadă incomplet stabilizat în primii 40..60 cm, cu rezistență scăzută pe anumiți versanți și ușor umezit la suprafață. Umezirea stratului superficial al zăpezii va continua în etajul altitudinal 1800-2100 m pe fondul insolației și al temperaturilor situate ușor peste norme, care vor avea valori diurne apropiate de 0 grade în jurul altitudinii de 2000 m. În zona creștelor se mențin plăcile vechi de vânt, unele de grosimi importante, pe versanți cu orientări diferite. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, local de peste 2-3 metri. În zona creștelor sunt formate cornișe de mari dimensiuni. Noaptea și dimineața la suprafața stratului se vor forma cruste de îngheț, ce vor ceda pe parcursul zilei sub 2100 m. Pe pantele înclinate pot apărea curgeri izolate, în special pe versanții însoriți sau de la altitudini de 1800-2100 m și va exista riscul declanșării avalanșelor de dimensiuni medii și izolat mari, mai ales la supraîncărcări ale stratului cu turiști sau schiori, care să angreneze stratul cu rezistență încă scăzută de zăpadă de la suprafață, plăcile de vânt, iar în cazuri izolate unele straturi din profunzime - risc **însemnat (3)**.

Sub 1800 m: Stratul de zăpadă e consistent și parțial umezit, depășind local 30..50 cm la altitudini de 1500 m. Insolația și temperaturilor diurne pozitive vor umezi în continuare stratul. Se pot declanșa unele curgeri pe anumite pante sau văi lipsite de vegetație sau avalanșe de dimensiuni medii înspre 1800 m, riscul fiind amplificat la supraîncărcări ale stratului - risc **moderat(2)**. Avalanșe de dimensiuni mai mari pot coborî de la peste 1800 m spre altitudini mai joase, riscul fiind mai crescut pe văile și pantele ce pornesc din zonele înalte, de pe fețele mai încărcate sau ale unor versanți sudici și sud-estici.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 06.03.2026 ora 20 - 09.03.2026 ora 20

CARPAȚII MERIDIONALI: ȚARCU-GODEANU și PARÂNG-ȘUREANU

RISC 3- ÎNSEMNAȚ





La peste 1800 m: În partea superioară a zăpezii regăsim un strat de 30..50 cm cu rezistență încă scăzută pe anumiți versanți, ușor umezit în partea superioară. Insolția și temperaturile diurne apropiate de 0 grade în jurul altitudinii de 2000 m vor duce la umezirea suplimentară a stratului superficial și la curgeri izolate în zona 1800-2100 m, ce pot angrena în cazuri excepționale și unele straturi din profunzime. În zona creștelor se întâlnesc plăci de vânt pe versanți cu orientări diferite și sunt formate cornișe de mari dimensiuni. Pe văi depozitele de zăpadă sunt consistente, depășind local 2 metri. Noaptea și dimineața la suprafața stratului se vor forma cruste de îngheț, ce vor ceda pe parcursul zilei. Pe pantele înclinate, mai ales la supraîncărcări, se pot semnala avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari, care să angreneze straturile de zăpadă cu rezistență relativ redusă din partea superioară, plăcile de vânt formate în zonele înalte, precum și unele straturi din profunzime - risc **însemnat (3)**.

Sub 1800 m:

Stratul de zăpadă este consistent până înspre altitudini joase, depășind 30-50 cm la altitudini de 1500 m. Insolția și temperaturile diurne pozitive vor duce la umezirea suplimentară și la tasarea ușoară a stratului. Se pot unele semnala curgeri pe anumite pante sau văi lipsite de vegetație și avalanșe de dimensiuni medii înspre 1800 m, cu precădere la supraîncărcări ale stratului. Riscul va fi **moderat(2)**. Avalanșe de dimensiuni mai mari pot coborî de la peste 1800 m spre altitudini mai joase, riscul fiind mai crescut pe văile și pantele ce pornesc din zonele înalte, de pe fețele mai încărcate sau ale unor versanți sudici și sud-estici.

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVUL RODNEI

RISC 3- ÎNSEMNAȚ



La peste 1800 m: În partea superioară a zăpezii întâlnim un strat de 30..40 cm ce prezintă în continuare o rezistență relativ scăzută, constituit din depunerile succesive de zăpadă din ultima parte a lunii februarie. Insolția și temperaturile diurne apropiate de 0 grade la altitudini de 2000 m vor continua să umezească ușor zăpada, ceea ce poate duce la curgeri izolate, în special pe versanții însoriți. În profunzime se întâlnesc cruste mai vechi de gheață, dar izolat și zone cu cristale tip cupă, ce se pot constitui în planuri de alunecare pentru zăpada de deasupra. În zona creștelor se întâlnesc plăci de vânt, de grosimi variabile, pe versanți cu orientări diferite. Depozite mai consistente se întâlnesc pe văile adăpostite, local de 1-2 metri. Pe pantele înclinate va exista riscul unor curgeri sau al declanșării de avalanșe de dimensiuni medii și cu totul izolat mari, care să angreneze plăcile de vânt prezente în zona creștelor și stratul incomplet stabilizat din partea superioară, riscul fiind prezent mai ales la suprasarcini - risc **însemnat(3)**.




Sub 1800 m: stratul de zăpadă este mai consistent la altitudini de peste 1500 m, cu depozite mai însemnate pe anumite văi. Insolția și temperaturile diurne pozitive vor duce la umezirea suplimentară și tasarea stratului. Se mențin condițiile pentru avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii pe unele văi apropiate de 1800 m, cu depozite mai consistente, riscul fiind prezent la supraîncărcări - risc **moderat(2)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 06.03.2026 ora 20 - 09.03.2026 ora 20

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVELE CĂLIMANI-BISTRIȚEI, CEAHLĂU

RISC 2 - MODERAT




La peste 1800 m: În partea superioară a zăpezii întâlnim un strat incomplet stabilizat în primii 20 cm. Insolația și temperaturile diurne apropiate de 0 grade la altitudini de 2000 m (Călimani) vor continua să umezească ușor zăpada, ceea ce poate duce la curgeri izolate, în special pe versanții însoriți. În profunzime se întâlnesc cruste mai vechi de gheață, dar izolat și zone cu cristale tip cupă pe versanții nordici. În zona creștelor se întâlnesc unele plăci vechi de vânt. Depozite mai consistente se întâlnesc pe văile adăpostite, local de 1-2 metri. Pe pantele înclinate va exista riscul unor curgeri sau al declanșării de avalanșe de dimensiuni mici și medii, care să angreneze plăcile de vânt prezente în zona creștelor și stratul incomplet stabilizat din partea superioară, riscul fiind prezent mai ales la suprasarcini - risc risc **moderat(2)**.

Sub 1800 m: stratul de zăpadă este mai consistent la altitudini de peste 1500 m, cu depozite mai însemnate pe anumite văi și cu zone cu zăpadă incomplet stabilizată, ce este depusă pe anumite pante peste vechea zăpadă, întărită, cu care are local coeziune redusă. Insolația și temperaturile diurne pozitive vor duce la umezirea suplimentară și tasarea stratului. Se mențin condițiile pentru avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii pe unele văi apropiate de 1800 m, cu depozite mai consistente, riscul fiind prezent la supraîncărcări - risc **moderat(2)**.

CARPAȚII OCCIDENTALI

RISC 2 - MODERAT



Stratul de zăpadă are în medie grosimi de 30-35 cm și izolat mai mult pe anumiți versanți nordici, cu unele depozite mai importante de zăpadă pe văile adăpostite. Insolația și temperaturile diurne pozitive vor duce la umezirea suplimentară și tasarea stratului. Pe pantele înclinate va exista riscul declanșării unor curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii pe văile și pantele cu acumulări mai importante, care să angreneze zăpada cu rezistență medie din partea superioară, precum și unele plăci vechi de vânt din apropierea creștelor, mai ales la suprasarcini. Riscul de avalanșă va fi **moderat(2)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 06.03.2026 ora 20 - 09.03.2026 ora 20

EVOLUȚIA VREMII DIN ULTIMELE 2 ZILE

Deși temperaturile au înregistrat o scădere, vremea s-a situat termic ușor peste cea obișnuită a perioadei, cu maxime pozitive la altitudini de sub 1800 m și cu minime negative în întreaga arie montană. Cerul a fost variabil, temporar noros pe parcursul zilei de joi, 05 martie, când pe arii restrânse s-au semnalat precipitații mixte slabe. Vântul a suflat slab și moderat, cu unele intensificări temporare de 40-60 km/h și trecător de 70-80 km/h pe crestele Carpaților Meridionali și Orientali. Pe alocuri s-a semnalat ceață în zonele înalte, asociată izolat și cu depuneri de chiciură pe creste.

Stratul de zăpadă a scăzut cu 1-2 cm în zonele înalte și cu 2-4 cm sub 1500 m.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsura, în data de 06.03.2026, ora 14:

Carpații Meridionali: 192 cm la Vârful Omu, 186 cm la Bălea-Lac, 153 cm la Țarcu, 55 cm la Sinaia, 48 cm la Cuntu, 35 cm la Parâng, 37 cm la Păltiniș, 20 cm la Predeal, 20 cm la Fundata.

Carpații Orientali: 115 cm la Călimani, 87 cm la Lăcăuți, 47 cm la Bucin, 40 cm la Iezer-Rodnei, 43 cm la Ceahlău, 31 cm la Penteleu, 5 cm la Poiana Stampei

Carpații Occidentali: 75 cm la Semenice, 47 cm la Băișoara, 36 cm la Vlădeasa 1800, 32 cm la Stâna de Vale, petice la Roșia Montană

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 06.03.2026 ora 20 - 09.03.2026 ora 20

Vremea va fi în general frumoasă, cu temperaturi diurne pozitive sub 2000 m la orele amiezilor și cu minime negative în întreaga arie montană. Cerul va fi variabil și senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe crestele montane la noapte și pe parcursul zilei de sâmbătă, 07 martie, în intensificare graduală în cursul zilei de duminică și luni din sector sud-estic, la viteze de 50-70 km/h în zonele înalte din Carpații Meridionali și Orientali și cu rafale ce pot depăși trecător 80 km/h pe crestele Carpaților Meridionali. Izolat vor fi condiții de ceață. Stratul de zăpadă va continua să scadă în întreaga arie montană.

Temperaturi prognozate în intervalul 06.03.2026 ora 20 - 09.03.2026 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în general între -9 ... -3 grade

temperaturi maxime: în general între -4 ... 2 grade

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în general între -5 ... 1 grad

temperaturi maxime: în general între 1 ... 9 grade

mtg. Udo Reckerth

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc