





Buletin nivometeorologic pentru perioada: 13.03.2026 ora 20 - 16.03.2026 ora 20



MUNȚII FĂGĂRAȘ ȘI BUCEGI

RISC 2 - MODERAT






La peste 1800 m: În apropierea creștelor și pe versanții nordici sau umbriți regăsim cruste portante de zăpadă înghețată la suprafață, iar în profunzime zăpadă cu rezistență în creștere, în timp ce pe versanții sudici sau însoriți se va întâlni pe timpul zilei un strat superficial de zăpadă umedă, de grosimi variabile. Umezirea zăpezii va continua în etajul altitudinal 1800-2000 m pe fondul insolației și al temperaturilor diurne apropiate de 0 grade. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, local de peste 2 metri. În zona creștelor sunt formate cornișe, unele de mari dimensiuni. Pe pantele înclinate pot apărea curgeri izolate, în special pe versanții de la altitudini de 1800-2000 m și va exista în continuare riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii, mai ales la supraîncărcări ale stratului cu turiști sau schiori, care să angreneze stratul incomplet stabilizat de la suprafață - risc **moderat(2)**. În cazuri izolate, la supraîncărcări mari ale stratului, pot fi dislocate unele straturi din profunzime.

Sub 1800 m: Stratul de zăpadă e consistent și umezit, depășind local 30 cm la altitudini de 1500 m. Insolația și temperaturile diurne pozitive vor umezi în continuare stratul. Se pot declanșa unele curgeri pe anumite pante sau văi lipsite de vegetație sau izolat avalanșe de dimensiuni medii înspre 1800 m, chiar până la fund, riscul fiind amplificat la supraîncărcări ale stratului - risc **moderat(2)**.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 13.03.2026 ora 20 - 16.03.2026 ora 20

CARPAȚII MERIDIONALI: ȚARCU-GODEANU și PARÂNG-ȘUREANU

RISC 2- MODERAT






La peste 1800 m: În apropierea creștelor și pe versanții nordici sau umbriți întâlnim la suprafața stratului cruste portante de zăpadă înghețată, iar în profunzime zăpadă cu rezistență în creștere. Pe versanții sudici sau însoriți zăpada se va menține umezită în stratul superficial, în special în jurul amiezilor. Insolția și temperaturile diurne apropiate de 0 grade în jurul altitudinii de 1800 m vor duce la umezirea suplimentară a stratului superficial și la curgeri izolate în zona 1800-2000 m, ce pot angrena în cazuri excepționale și unele straturi din profunzime. În zona creștelor sunt formate cornișe, unele de mari dimensiuni. Pe văi depozitele de zăpadă sunt consistente, depășind local 2 metri. Pe pantele înclinate, mai ales la supraîncărcări, se pot semnala avalanșe de dimensiuni medii, care să angreneze straturile de zăpadă cu rezistență moderată din partea superioară, iar în cazuri izolate, la supraîncărcări mari ale zăpezii, unele straturi din profunzime - risc moderat(2).

Sub 1800 m:

Stratul de zăpadă e consistent până înspre altitudini joase, depășind local 30 cm la altitudini de 1500 m. Insolția și temperaturile diurne pozitive vor duce la umezirea suplimentară a stratului. Se pot semnala unele curgeri pe anumite pante sau văi lipsite de vegetație și izolat avalanșe de dimensiuni medii înspre 1800 m, chiar până la fund, cu precădere la supraîncărcări ale stratului. Riscul va fi moderat(2).

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVELE RODNEI, CĂLIMANI-BISTRITELI

RISC 2- MODERAT



La peste 1800 m: În apropierea creștelor și pe versanții nordici sau umbriți întâlnim la suprafața stratului cruste portante de zăpadă înghețată, iar în profunzime zăpadă cu rezistență în creștere. Pe versanții sudici sau însoriți zăpada este umedă în stratul superficial, în special la orele prânzului. Insolția și temperaturile diurne apropiate de 0 grade la altitudini de 1800 m vor continua să umezească ușor zăpada, ceea ce poate duce la curgeri izolate, în special pe versanții însoriți. Depozite mai consistente se întâlnesc pe văile adăpostite, local de 1-2 metri. Pe pantele înclinate va exista riscul unor curgeri sau al declanșării de avalanșe de dimensiuni medii, care să angreneze stratul incomplet stabilizat din partea superioară, iar în cazuri izolate, la supraîncărcări mari ale zăpezii, inclusiv unele straturi din profunzime, riscul fiind prezent mai ales la suprasarcini - risc moderat(2).


Sub 1800 m: stratul de zăpadă este mai consistent la altitudini de peste 1500 m, cu depozite mai însemnate pe anumite văi. Insolția și temperaturile diurne pozitive vor duce la umezirea suplimentară a stratului. Se mențin condițiile pentru avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii pe unele văi apropiate de 1800 m, cu depozite mai consistente, riscul fiind prezent la supraîncărcări - risc moderat(2).

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 13.03.2026 ora 20 - 16.03.2026 ora 20

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVUL CEAHLĂU



RISC 1 - REDUS



Stratul de zăpadă este mai consistent la altitudini de peste 1500 m, cu depozite mai însemnate pe anumite văi umbrite și prezintă zone cu zăpadă în curs de stabilizare, ce este depusă pe anumite pante nordice peste o zăpadă veche și întărită. Insolația și temperaturile diurne pozitive vor duce la umezirea suplimentară a stratului, în special pe versanții sudici sau însoriți. Se mențin condițiile pentru avalanșe de dimensiuni mici, mai ales pe unele văi apropiate de 1800 m, cu depozite mai consistente, riscul fiind amplificat la supraîncărcări ale stratului - risc redus(1)

CARPAȚII OCCIDENTALI

RISC 2 - MODERAT



În apropierea creștelor întâlnim zone cu cruste portante de zăpadă înghețată, mai ales pe versanții nordici sau umbriți. Stratul de zăpadă are în medie grosimi de 20-30 cm, cu unele depozite mai importante de zăpadă pe văile adăpostite. Insolația și temperaturile diurne pozitive vor duce la umezirea suplimentară și la tasarea stratului. Pe versanții însoriți va exista riscul declanșării unor curgeri, iar pe pantele mai înclinate de avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat medii pe văile și pantele cu acumulări mai importante, care să angreneze zăpada cu rezistență medie din partea superioară, mai ales la suprasarcini. Riscul de avalanșă va fi moderat(2).

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 13.03.2026 ora 20 - 16.03.2026 ora 20

EVOLUȚIA VREMII DIN ULTIMELE 2 ZILE

Vremea a fost frumoasă, iar cerul mai mult senin. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări izolate. Stratul de zăpadă a scăzut în întreaga arie montană, în medie cu 2-4 cm în zonele înalte și cu până la 9 cm la Semenic și 8 cm la Stâna de Vale.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsura, în data de 13.03.2026, ora 14:

Carpații Meridionali: 182 cm la Vârful Omu, 168 cm la Bâlea-Lac, 147 cm la Țarcu, 39 cm la Sinaia, 40 cm la Cuntu, 24 cm la Parâng, 28 cm la Păltiniș, 11 cm la Predeal, 7 cm la Fundata.

Carpații Orientali: 108 cm la Călimani, 71 cm la Lăcăuți, 35 cm la Bucin, 30 cm la Iezer-Rodnei, 34 cm la Ceahlău, 21 cm la Penteleu.

Carpații Occidentali: 60 cm la Semenic, 32 cm la Băișoara, 31 cm la Vlădeasa 1800, 15 cm la Stâna de Vale,.

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 13.03.2026 ora 20 - 16.03.2026 ora 20

Vremea va fi în general frumoasă, cu temperaturi diurne pozitive la orele amiezilor, exceptând creștele cele mai înalte, și cu minime predominant negative. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare de 40-60 km/h în zonele montane înalte din Carpații Meridionali și Orientali. Stratul de zăpadă va continua să scadă în întreaga arie montană.

Temperaturi prognozate în intervalul 13.03.2026 ora 20 - 16.03.2026 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în general între -7 ... -1 grad

temperaturi maxime: în general între -2 ... 5 grade

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în general între -2 ... 3 grade

temperaturi maxime: în general între 5 ... 11 grade

mtg. Udo Reckerth

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc