







Buletin nivometeorologic pentru perioada: 16.03.2026 ora 20 - 18.03.2026 ora 20



MUNȚII FĂGĂRAȘ ȘI BUCEGI

RISC 2 - MODERAT



La peste 1800 m: Pe majoritatea pantelor regăsim cruste portante de zăpadă înghețată la suprafață, mai consistente la peste 2000 m și pe versanții umbriți, iar în profunzime zăpadă cu rezistență în creștere, exceptând unele porțiuni restrânse ca areal, ce prezintă o rezistență medie în zona superioară. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, local de peste 2 metri. În zona creștelor sunt formate cornișe. Pe pantele înclinate ale unor versanți sudici sau însoriți mai pot apărea curgeri izolate în jurul altitudinii de 1800 m. Va exista în continuare riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii, mai ales la supraîncărcări ale stratului cu turiști sau schiori, care să angreneze stratul incomplet stabilizat de la suprafață și pe alocuri unele plăci mai vechi de vânt din apropierea creștelor - risc **moderat(2)**. În cazuri izolate, la supraîncărcări mari ale stratului, pot fi dislocate unele straturi din profunzime.

Sub 1800 m: Stratul de zăpadă e umezit și mai consistent la altitudini de peste 1600 m. Temperaturile diurne pozitive vor umezi în continuare stratul la orele amiezilor. Se mai pot declanșa curgeri izolate pe anumite pante sau văi lipsite de vegetație sau avalanșe de dimensiuni mici, riscul fiind amplificat la supraîncărcări ale stratului - risc **redus(1)**.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 16.03.2026 ora 20 - 18.03.2026 ora 20




METEO



ROMANIA

CARPAȚII MERIDIONALI: ȚARCU-GODEANU ȘI PARÂNG-ȘUREANU

RISC 2- MODERAT






La peste 1800 m: La suprafața stratului întâlnim cruste portante de zăpadă înghețată pe majoritatea pantelor, mai consistente pe versanții nordici sau umbriți, iar în profunzime zăpadă cu rezistență în creștere. Pe unele areale restrânse se mai întâlnește zăpadă incomplet stabilizată, ce poate fi dislocată la supraîncărcări ale stratului. În zona creștelor sunt formate cornișe. Pe văi depozitele de zăpadă sunt consistente, depășind local 2 metri. Izolat mai pot apărea unele curgeri pe versanții sudici de la altitudini apropiate de 1800 m. Pe pantele înclinate, mai ales la supraîncărcări, se pot semna avalanșe de dimensiuni medii, care să angreneze straturile de zăpadă cu rezistență moderată din partea superioară, iar în cazuri izolate, la supraîncărcări mari ale zăpezii, unele straturi din profunzime - risc **moderat(2)**.

Sub 1800 m:

Stratul de zăpadă e consistent până înspre altitudini joase, depășind local 25..30 cm la altitudini de 1500 m. Temperaturile diurne pozitive vor duce la umezirea suplimentară a stratului. Se pot semna curgeri izolate pe anumite pante sau văi lipsite de vegetație și avalanșe de dimensiuni mici, cu precădere la supraîncărcări ale stratului. Riscul va fi **redus(1)**.

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVELE RODNEI, CĂLIMANI-BISTRIȚEI

RISC 2- MODERAT



La peste 1800 m: Pe majoritatea pantelor la suprafața stratului regăsim cruste portante de zăpadă înghețată, mai consistente pe versanții nordici sau umbriți, iar în profunzime întâlnim zăpadă cu rezistență în creștere, exceptând unele areale restrânse în care stratul prezintă rezistență medie. Pe versanții sudici sau însoriți, la altitudini apropiate de 1800 m, zăpada va fi ușor umezită în stratul superficial la orele prânzului. Depozite mai consistente se întâlnesc pe văile adăpostite, local de 1-2 metri. Pe pantele înclinate va exista riscul unor curgeri izolate sau al declanșării de avalanșe de dimensiuni mici și medii, care să angreneze stratul incomplet stabilizat din partea superioară, iar în cazuri izolate, la supraîncărcări mari ale zăpezii, inclusiv unele straturi din profunzime, riscul fiind prezent mai ales la suprasarcini - risc **moderat(2)**.


Sub 1800 m: stratul de zăpadă este mai consistent la altitudini de peste 1500 m, cu depozite mai însemnate pe anumite văi. Insolarea și temperaturile diurne pozitive vor duce la umezirea suplimentară a stratului. Se mențin condițiile pentru curgeri neînsemnate sau avalanșe de dimensiuni mici pe văile cu depozite mai consistente, riscul fiind prezent mai ales la supraîncărcări - risc **redus(1)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 16.03.2026 ora 20 - 18.03.2026 ora 20

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVUL CEAHLĂU


RISC 1 - REDUS



Stratul de zăpadă este mai consistent la altitudini de peste 1500 m, cu depozite mai însemnate pe anumite văi umbrite și prezintă zone cu zăpadă în curs de stabilizare, ce este depusă pe anumite pante nordice peste o zăpadă veche și întărită. Versanții sudici sau însoriți vor prezenta zăpadă umezită la orele prânzului. Se mențin condițiile pentru avalanșe de dimensiuni mici, mai ales pe unele văi apropiate de 1800 m, cu depozite mai consistente, riscul fiind amplificat la supraîncărcări ale stratului - risc **redus(1)**.

CARPAȚII OCCIDENTALI

RISC 1 - REDUS



În apropierea creștelor întâlnim zone cu cruste portante de zăpadă înghețată, mai ales pe versanții nordici sau umbriți. Stratul de zăpadă are în medie grosimi de 15-25 cm, cu unele depozite mai importante de zăpadă pe văile adăpostite. Insolația și temperaturile diurne pozitive vor duce la umezirea suplimentară și la tasarea stratului. Pe versanții însoriți va exista riscul declanșării unor curgeri izolate, iar pe pantele mai înclinate și cu acumulări mai importante de avalanșe de dimensiuni mici, care să angreneze zăpada cu rezistență medie localizată în areale restrânse, mai ales la suprasarcini. Riscul de avalanșă va fi **redus(1)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 16.03.2026 ora 20 - 18.03.2026 ora 20

EVOLUȚIA VREMII DIN ULTIMELE 3 ZILE

Vremea a fost frumoasă, cu temperaturi în ușoară scădere, iar cerul variabil. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări temporare de 40-60 km/h în zonele montane înalte, în special din Carpații Meridionali și Orientali și cu rafale ce au depășit trecător 70 km/h pe creste.

Stratul de zăpadă a scăzut în întreaga arie montană, cu până la 11 cm la Țarcu și 10 cm la Vârful Omu.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsura, în data de 16.03.2026, ora 14:

Carpații Meridionali: 172 cm la Vârful Omu, 166 cm la Bâlea-Lac, 136 cm la Țarcu, 35 cm la Sinaia, 36 cm la Cuntu, 19 cm la Parâng, 25 cm la Păltiniș, 5 cm la Predeal, 3 cm la Fundata.

Carpații Orientali: 106 cm la Călimani, 69 cm la Lăcăuți, 32 cm la Bucin, 30 cm la Iezer-Rodnei, 33 cm la Ceahlău, 19 cm la Penteleu.

Carpații Occidentali: 57 cm la Semenic, 27 cm la Băișoara, 30 cm la Vlădeasa 1800, 9 cm la Stâna de Vale.

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 16.03.2026 ora 20 - 18.03.2026 ora 20

Vremea se va răci ușor. Cerul va fi variabil, temporar noros. Pe arii restrânse se vor semnală precipitații mixte slabe, trecător ninsori în zonele înalte. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări temporare de 40-60 km/h, iar în zonele înalte cu rafale ce vor atinge 60-70 km/h și trecător 80 km/h pe creste. Stratul de zăpadă nu va suferi variații importante.

Temperaturi prognozate în intervalul 16.03.2026 ora 20 - 18.03.2026 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în general între -10 ... -3 grade

temperaturi maxime: în general între -5 ... 0 grade

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în general între -5 ... 0 grade

temperaturi maxime: în general între 0 ... 5 grade

mtg. Udo Reckerth

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc